

متوسطة العقيد لطفى - باتنة -	اختبار الثلاثي الثالث	التاريخ: 15 ماي 2017م
المستوى: الرابعة متوسط	في مادة الرياضيات	المدة الزمنية: ساعتان

التمرين الأول: 02 ن

1. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 696 و 406.

2. أكتب الكسر $\frac{696}{406}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال.

3. أحسب العدد E حيث: $E = \frac{696}{406} - \frac{3}{7} \times \frac{5}{2}$.

التمرين الثاني: 03,50 ن

تكن العبارة الجبرية F حيث: $F = (5x-6)(2x-7) - (2x-7)^2$.

1. بالنشر بين أن: $F = 6x^2 - 19x - 7$.

2. حلل العبارة الجبرية F إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3. حل المعادلة: $(2x-7)(3x+1) = 0$.

4. حل المتراجحة: $F \leq 6x^2 + 31$ ، ثم نثل مجموعة حلولها على مستقيم عددي.

التمرين الثالث: 03,50 ن

تكن (O ; I ; J) معلم متعامد و متجانس للمستوى. (وحدة الطول هي: cm).

1. علم النقط: A (2 ; 0) ، B (0 ; 1) ، C (0 ; -1).

2. أحسب إحداثيات النقطة D حيث أن: $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$.

3. عين النقطة E صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته 180° ثم أعط إحداثياتها بيانيا.

4. بين أن: $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$.

التمرين الرابع: 03 ن

إليك الشكل المقابل المرسوم بأطوال غير حقيقية (وحدة الطول هي: cm).


1. بين أن: $(AI) \parallel (OU)$.

2. أحسب الطول OU.

3. ما طبيعة المثلث AMI ؟

4. أحسب قياس الزاوية AIM.

5. بين أن للزاويتين MAI و MOU نفس القيس.



المسألة الأولى:

1. حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين: 969 و 406.
 $\rightarrow 696 = 406 \times 1 + 290$; $406 = 290 \times 1 + 116$; $290 = 116 \times 2 + 58$; $116 = 58 \times 2 + 0$
 إذن: $\text{PGCD}(696; 406) = 58$.
 كتابة الكسر $\frac{696}{406}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال:
 $\rightarrow \frac{696}{406} = \frac{696 \div 58}{406 \div 58} = \frac{12}{7}$
3. حساب العدد E:
 $\rightarrow E = \frac{696}{406} - \frac{3}{7} \times \frac{5}{2}$; $E = \frac{12}{7} - \frac{15}{14}$; $E = \frac{24}{14} - \frac{15}{14}$; $E = \frac{24-15}{14}$; $E = \frac{9}{14}$.

المسألة الثانية:

1. النشر والتبسيط:
 $\rightarrow F = (5x-6)(2x-7) - (2x-7)^2$; $F = 10x^2 - 12x - 35x + 42 - (4x^2 + 49 - 28x)$; $F = 10x^2 - 47x + 42 - 4x^2 - 49 + 28x$
 $F = 6x^2 - 19x - 7$.
2. التحليل إلى جداء عاملين:
 $\rightarrow F = (5x-6)(2x-7) - (2x-7)^2$; $F = (2x-7)[(5x-6) - (2x-7)]$; $F = (2x-7)(5x-6-2x+7)$;
 $\rightarrow F = (2x-7)(3x+1)$.

3. حل المعادلة:

1. $(2x-7)(3x+1) = 0$ معناه: $2x-7=0$ إذن: $x = \frac{7}{2}$ أو $3x+1=0$ إذن: $x = -\frac{1}{3}$.
 للمعادلة السابقة حلان هما على التوالي: $\frac{7}{2}$ و $-\frac{1}{3}$.

4. حل المتراجحة:

1. $F \leq 6x^2 + 31$; $6x^2 - 19x - 7 \leq 6x^2 + 31$; $-19x \leq 38$; $-19x \leq 38$; $x \geq -2$.
 مجموعة حلول المتراجحة السابقة هي قيم x الأكبر من أو يساوي -2.
 تمثيل مجموعة الحلول على مستقيم عددي: لاحظ التمثيل أسفله.

المسألة الثالثة:

1. تعليم النقاط: لاحظ التعليم أسفله.
2. حساب إحداثيات النقطة D حيث: $\overline{BA} = \overline{CD}$.
 لدينا: $\overline{BA} = \begin{pmatrix} 2-0 \\ -1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$; $\overline{CD} = \begin{pmatrix} x-0 \\ y+1 \end{pmatrix}$
 لدينا: $\overline{BA} = \overline{CD}$ معناه: $\begin{cases} x-0 = 2 \\ y+1 = -1 \end{cases}$; إذن: $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases}$; إذن: $D(2; -2)$.
 إحداثيات النقطة E هما (القراءة البيانية): 0 و -2 و نكتب: $E(0; -2)$.
3. نبين أن: $\overline{DC} = \overline{CE}$.
 لدينا: $\overline{DC} = \begin{pmatrix} -2-0 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\overline{CE} = \begin{pmatrix} -2-0 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
 لدينا: $\overline{DC} = \overline{CE}$ إذن: $\overline{DC} = \overline{CE}$.

المسألة الرابعة:

1. نبين أن: $(AI) // (OU)$.
 لدينا: $\frac{MU}{MI} = \frac{28}{36}$; $\frac{MO}{MA} = \frac{21}{27}$ و منه بعد اختزال كلا من النسبتين السابقتين نتحصل على النسبة: $\frac{7}{9}$ إذن:

و حسب عكس نظرية طالس فإن : $\frac{MU}{MI} = \frac{MO}{MA}$ (AI)/(OU).

2. حساب OU:

لأن : بما أن : (AI)/(OU) فإن : $\frac{MO}{MA} = \frac{MU}{MI} = \frac{OU}{AI}$ وبالتعويض العددي نجد : $\frac{21}{45} = \frac{OU}{27}$ إذن : $OU = \frac{45 \times 21}{27}$ إذن :

$$OU = 35m$$

3. طبيعة المثلث AMI:

لأن لدينا : $AM^2 = 27^2 = 729$ ، $MI^2 = 36^2 = 1296$ ، $AI^2 = 45^2 = 2025$ ، نلاحظ أن : $729 + 1296 = 2025$ أي أن : $AM^2 + MI^2 = AI^2$ ، فحسب عكس نظرية فيثاغورث فإن المثلث AMI قائم في الرأس M.

1.3. حساب قياس الزاوية $\widehat{AIM}$:

لأن لدينا مثلاً : $\tan \widehat{AIM} = \frac{AM}{MI} = \frac{27}{36}$ ، $\tan \widehat{AIM} = 0,75$ ، $\tan \widehat{AIM} = 0,75$ ،

و عندما نعود إلى استعمال الآلة الحاسبة للبحث عن الزاوية التي ظلها (tan) هو : 0,75 نجدها بالتقريب : $36,86^\circ$ و بالتدوير إلى الوحدة نجد : $\widehat{AIM} = 37^\circ$.

4. نبين أن للزاويتين $\widehat{MAI}$ و $\widehat{MOI}$ نفس القياس :

لأن لدينا : (AI)/(OU) و ذلك من البرهان السابق ، و لدينا : (AO) قاطع لهما في النقطتين : O و A على الترتيب ، و منه : $\widehat{MAI} = \widehat{MOI}$ و ذلك بالتبادل الداخلي.

السؤال الثاني:

الجزء الأول:

1. حساب طول وعرض قطعة الأرضية:

لأن نفرض أن طول القطعة هو : x و بالتالي فإن عرضها هو : $\frac{3}{4}x$ ، و منه :

$$x(\frac{3}{4}x) = 1200 \text{ ، } \frac{3}{4}x^2 = 1200 \text{ ، } x^2 = 1200 \times \frac{4}{3} \text{ ، } x^2 = 1600 \text{ ، } x = \sqrt{1600} \text{ ، } x = 40m \text{ ، } \text{ إذن : } x = 40m$$

وهو طول القطعة، أما عرضها فهو : $40 \times \frac{3}{4} = 30m$.

2. حساب سعر المتر المربع الواحد من القطعة:

لأن لدينا المبلغ الذي دفعه كمال مقابل شراء القطعة الأرضية هو : 9600000DA و بالتالي فإن سعر المتر المربع الواحد

$$\frac{9600000}{1200} = 8000D \text{ هو : } 8000D$$

الجزء الثاني:

1. التعبير عن S_1 و S_2 بدلالة x:

لأن لدينا S_1 هي مساحة القطعة FNL والتي على شكل مثلث، و منه :

$$S_1 = \frac{NL \times EM}{2} \text{ و بالتعويض العددي نجد : } S_1 = \frac{30(40-x)}{2} \text{ ، } S_1 = 600 - 15x \text{ ، } \text{ إذن : } S_1 = 600 - 15x$$

لأن لدينا S_2 هي مساحة القطعة EFNM والتي على شكل شبه منحرف، إذن :

$$S_2 = \frac{EM(EF+MN)}{2} \text{ و بالتعويض العددي نجد : } S_2 = \frac{30(20+x)}{2} \text{ ، } S_2 = 300 + 15x \text{ ، } \text{ إذن : } S_2 = 300 + 15x$$

2. البحث عن قيمة x التي من أجلها تتساوى القطعتين:

$$\text{لأن لدينا : } S_1 = S_2 \text{ و منه : } 600 - 15x = 300 + 15x \text{ ، } 600 - 15x - 15x = 300 - 600 \text{ ، } -30x = -300 \text{ ، } -30x = -300 \text{ ، } x = \frac{-300}{-30} \text{ و منه : } x = 10m$$

$$x = 10m$$

الجزء الثالث:

1. التمثيل البياني:

لأن لدينا : بيان الدالة f هو المستقيم (Δ) الذي معادلته : $y = 600 - 15x$ و الذي يشمل النقطتين : A (10 ; 450)

و B (0 ; 600)

لدينا: بيان الدالة g هو المستقيم (D) الذي معادلته: $y=300+15x$ والذي يشمل النقطتين: A (10 ;450)

و E(0 ;300).


2. الحل البياني للجملة:

$$\begin{cases} 15x + y = 600 \\ -15x + y = 300 \end{cases}$$


من البيان نلاحظ أن بيان الدالة f وبيان الدالة g يتقاطعان في النقطة A التي تنطبق على النقطة C، وبالتالي فإن الجملة السابقة لها حل واحد وهو الثانية المرتبة (10 ;450).

❖ التمثيلات البيانية السابقة لكل تمرين

1. تمثيل مجموعة حلول المتراجحة على مستقيم عددي (التمرين الثاني)



2. تعليم النقط في مستو مزود بمعظم متعامد و متجانس (ل; ا; 0) (التمرين الثالث)



3. تمثل الدالة f و الدالة g في معطم متعامد و متجانس (ل; ا; 0) (المسألة)

