

على المتر شح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأولالتمرين الأول (04 نقاط)النقطتان A_0 و B_0 من المستوي بحيث $A_0B_0 = 8$ (الوحدة هي السنتيمتر)التشابه المباشر S الذي مركزه النقطة A_0 ونسبته $\frac{1}{2}$ و $\frac{3\pi}{4}$ زاوية لهنعرف متتالية النقط (B_n) بـ : من أجل كل عدد طبيعي n : $B_{n+1} = S(B_n)$ (1) أنشئ النقط : B_1, B_2, B_3 و B_4 (2) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n المثلثان $A_0B_nB_{n+1}$ و $A_0B_{n+1}B_{n+2}$ متشابهان(3) نعرف المتتالية (u_n) بـ : من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = B_nB_{n+1}$ (أ) أثبت أن (u_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ (ب) جد عبارة u_n بدلالة n و u_0 (ج) نضع : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, جد $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ (4) (أ) حل في مجموعة الأعداد الصحيحة المعادلة : $3x - 4y = 2$ (ب) المستقيم (Δ) العمودي على المستقيم (A_0B_0) في النقطة A_0 ، جد قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها تكون النقطة B_n تنتمي إلى المستقيم (Δ) التمرين الثاني: (05 نقاط)1 نعطي في مجموعة الأعداد المركبة العبارة $P(z) = z^3 + (-8+i)z^2 + (25-8i)z + 25i$:1- أ- تحقق أن $p(-i) = 0$ ب- جد العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل عدد مركب z : $P(z) = (z+i)(z^2 + az + b)$ ج- حل في $\square$ المعادلة : $p(z) = 0$ 2 (المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(0; \vec{u}; \vec{v})$, النقط $C; B; A$ و D هي صور الأعداد المركبة $z_D = 4 - 3i$ و $z_C = 4 + 3i$, $z_B = -i$, $z_A = 1$ على الترتيب.من أجل كل نقطة M تختلف عن A لاحتقها z نرفق النقطة M' لاحتقها z' حيث $z' = \frac{-iz + 4i - 3}{z - 1}$ أ- تحقق أن $z' + i = \frac{-3 + 3i}{z - 1}$ ب- بين أن $AM \times BM' = 3\sqrt{2}$ و $(\vec{u}; \overline{AM}) + (\vec{u}; \overline{BM'}) = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ حيث k عدد صحيحج- عين (∂) مجموعة النقط M من المستوي حيث $z' + i = 3e^i$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كريات بيضاء مرقمة بـ : 1 ، 1 ، 0 ، 1 ، -1 وخمس كريات سوداء مرقمة بـ : 1 ، 1 ، 0 ، 0 ، -1 لا نميز بينها باللمس ، نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من الصندوق .
I. نعطي الأحداث التالية :

A : "الحصول على كرية بيضاء واحدة فقط" . B : "الحصول على كرية بيضاء على الأقل"

C : "الكريات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون" . D : "الحصول على اللونين الأبيض والأسود"

F : "مجموع أرقام الكريات الثلاث المسحوبة يساوي 0" .

1- أحسب احتمال الأحداث A ، B و C .

2- بين أن : $P(D) = \frac{5}{6}$ ، $P(F) = \frac{31}{120}$ و $P(C \cap F) = \frac{7}{120}$.

3- إذا كان مجموع أرقام الكريات المسحوبة يساوي 0 ما هو احتمال أن تكون الكريات الثلاث من نفس اللون ؟
II. نعطي المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل مخرج مجموع أرقام الكريات الثلاث المسحوبة .

عين قيم المتغير العشوائي X عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(1) الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{x+1}{2x+1} - \ln(x)$

أ- احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

ب- ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

ج- بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,84 < \alpha < 1,83$. أستنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$

(2) الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{2\ln(x)}{x^2 + x}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ الوحدة 2cm

أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. ثم فسر النتيجة بيانيا .

ب- اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{2(2x+1)}{(x^2+x)^2} \times g(x)$

. ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ج- بين أن : $f(\alpha) = \frac{2}{\alpha(2\alpha+1)}$. استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(3) أكتب معادلة المماس (T) في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$. ثم أنشئ كل من المماس (T) و المنحني (C_f) .

(4) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.

(5) أ- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \geq 1$ ، أن: $\frac{\ln(x)}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{\ln(x)}{x}$

ب - أحسب $I = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln(x)}{x} dx$. ثم باستعمال التكامل بالتجزئة أحسب $J = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

ج - استنتج حصرا للعدد K حيث : $K = \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) dx$.

(6) المساحة A الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلاتهما: $x = 1$ و $x = \frac{3}{2}$

أكتب A بدلالة K . ثم استنتج قيمة مقربة بـ: cm^2 للمساحة A .

انتهى الموضوع الأول


الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) نعطي المعادلة (E) ذات المجهول $(n; m)$: $11n - 24m = 1$ حيث m و n عدنان صحيحان. جد الحل الخاص $(n_0; m_0)$ للمعادلة (E) ثم استنتج حلول المعادلة (E).
- (2) بين أن 9 يقسم كل من $10^{11} - 1$ و $10^{24} - 1$.
- (3) بين أن $9 = 10(10^{24m} - 1) - (10^{11n} - 1)$ حيث $(n; m)$ احد حلول المعادلة (E) من الأعداد الطبيعية.
- (4) من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم n و من اجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$ بين أن : $(x-1)(1+x+x^2+\dots+x^{n-1}) = x^n - 1$
- (ب)-بين أن : $10^{11} - 1$ يقسم $10^{11n} - 1$ و أن : $10^{24} - 1$ يقسم $10^{24m} - 1$
- (ج)- اثبت انه يوجد عدنان صحيحان M و N بحيث $(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9$.
- (5) اثبت أن كل قاسم مشترك لـ $10^{24} - 1$ و $10^{11} - 1$ يقسم 9.
- ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر PGCD لكل من $10^{24} - 1$ و $10^{11} - 1$

التمرين الثاني: (04 نقاط) :

المكعب $ABCDEFGH$ طول ضلعه 1، I منتصف القطعة $[EF]$ و J نظيرة النقطة E بالنسبة للنقطة F



ينسب الفضاء إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$

- (1) أ) عين إحداثيات النقطتين I و J
- ب) تحقق أن الشعاع $\overrightarrow{DJ}$ ناظمي على المستوي (BGI)
- ج) استنتج المعادلة الديكارتية للمستوي (BGI)
- د) أحسب المسافة بين F و المستوي (BGI)
- (2) نضع المستقيم (Δ) المار من F و العمودي على المستوي (BGI)
- أ) أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ)
- ب) بين أن المستقيم (Δ) يشمل النقطة K مركز الوجه $ADHE$
- ج) بين أن المستقيم (Δ) و المستوي (BGI) يتقاطعان في النقطة P إحداثياتها $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right)$
- د) هل النقطة P هي نقطة تقاطع ارتفاعات المثلث BGI ؟ علّل إجابتك.
- (3) عين معادلة سطح الكرة (S) الموجودة داخل المكعب $ABCDEFGH$ والتي تمس أوجهه الستة.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1. أ) عين الجذرين التربيعيين للعدد المركب: $L = 2 + 2i\sqrt{3}$

ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة: $(z^2 - 2 - 2i\sqrt{3})(z^2 + 1) = 0$

2. نعطي النقط A, B, C, D من المستوي لواحقتها علي الترتيب $z_A = \sqrt{3} + i, z_B = \sqrt{3} - i, z_C = i, z_D = 1$.

أقلب الورقة

أ) اكتب العدد المركب $\frac{z_A}{z_B}$ علي الشكل الاسي ثم استنتج طبيعة المثلث OAB

ب) هل توجد قيم للعدد الطبيعي n حتي يكون العدد $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n$ تخيليا صرفا

3. أ) عين عبارة التشابه المباشر S الذي مركزه A و يحول النقطة B الي النقطة C محددا عناصره المميزة
ب) عين و انشئ القطعة $[B'C']$ صورة القطعة المستقيمة $[BC]$ بالتشابه S مستنتجا مساحة المثلث $AB'C'$

4. أ) عين (ψ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z بحيث يكون: $\frac{z - z_C}{z - z_B}$ عددا حقيقيا سالبا تماما.

ب) عين (γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z بحيث: $z = -3 - 2i - ke^{\frac{i\pi}{4}}$ مع $k \in R^+$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I:

نعطي المعادلة التفاضلية: $y' + y = e^{-x} \dots (E)$

1. بين أن الدالة u المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $u(x) = xe^{-x}$ حل للمعادلة (E)

2. حل المعادلة التفاضلية $y' + y = 0 \dots (E_0)$

3. بين أن الدالة v المعرفة و القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ تكون حلا للمعادلة (E_0)

إذا وفقط إذا كانت $v + u$ حلا للمعادلة (E) - استنتج جميع حلول المعادلة (E) .

4. عين الدالة f_2 حل المعادلة (E) التي تأخذ القيمة 2 من أجل 0.

II:

للدالة f_k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_k(x) = (x+k)e^{-x}$ و k عدد حقيقي

نرمز بـ $(\mathcal{C}_k)$ إلى تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين نهايات f_k عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

2. احسب من أجل كل عدد حقيقي x : f'_k ثم شكل جدول تغيرات الدالة f_k

III:

المتتالية (I_n) المعرفة بـ $I_0 = \int_{-2}^0 e^{-x} dx$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$: $I_n = \int_{-2}^0 x^n e^{-x} dx$

1. أ- احسب القيمة المضبوطة لـ I_0 .

ب - باستعمال المكاملة بالتجزئة بين أن: $I_{n+1} = (-2)^{n+1} e^2 + (n+1)I_n$


ج - استنتج القيم المضبوطة لـ I_1 و I_2 .

2. التمثيل البياني الموالي $(\mathcal{C}_k)$ هو لدالة f_k المعرفة في الجزء II.

أ- باستعمال المعلومات المتوفرة في الشكل، عين قيمة k المرفقة بالمنحنى $(\mathcal{C}_k)$.

ب- المساحة S للجزء المظلل (مقدرة بوحدة المساحات).

عبر عن S بدلالة I_0 و I_1 ثم استنتج القيمة المضبوطة للمساحة S .



انتهى الموضوع الثاني

بالتوفيق صح رمضانكم وصح فطوركم