



امتحان البكالوريا التجريبي

المدرسة العليا للأساتذة بورقلة
مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية
دورة أفريل 2025
الشعبة: تقني رياضي
المادة: رياضيات
المدة: 4 ساعات و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول (4 ن)

- يراد عشوائيا تشكيل لجنة تضم رئيسا، نائبا له وكاتباً، من بين خمسة رجال أحدهم اسمه عمر، وأربع نساء.
- أحسب احتمال كل حدث من الأحداث الآتية
أ. A : " أعضاء اللجنة من نفس الجنس ".
ب. B : " عمر كاتباً للجنة ".
ج. C : " عمر عضو في اللجنة ".
2. بين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{42}$ ، ثم استنتج $P(A \cup B)$
3. نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل لجنة عدد الرجال فيها.
أ. بين أن $P(X = 1) = \frac{5}{14}$ و $P(X = 2) = \frac{10}{21}$
ب. عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم استنتج أمله الرياضي $E(X)$
ج. أحسب احتمال الحدث $(\log X > 0)$

التمرين الثاني (4 ن)

- أ. أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13
ب. استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^{2025} على 13
2. بين أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، العدد $7 \times 42^{3n} - 2 \times 55^{3n+1} + 1962$ مضاعف لـ 13
3. عين الأعداد الطبيعية n التي تحقق $n^2 + 29^{3n+1} \times 2n + 16^{3n+2} \equiv 0 [13]$
4. عين كل الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي تحقق ما يلي

$$\begin{cases} 3^x + 3^y \equiv 5 [13] \\ x < y < 11 \\ PGCD(x; y) = 1 \end{cases}$$

التمرين الثالث (5 ن)

المتتالية العددية (U_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = 5 - \frac{18}{U_n + 4} \end{cases}$$

(I) 1. برهن بالتراجع أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $U_n > 2$ 2. أدرس اتجاه تغير (U_n) ثم استنتج أنها متقاربة.(II) المتتالية العددية (V_n) معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ $V_n = \frac{U_n - 2}{U_n + 1}$ 1. بين أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم أكتب عبارة V_n بدلالة n 2. بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $U_n = \frac{2 + V_n}{1 - V_n}$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ 3. أ. أحسب بدلالة n المجموع S حيث $S = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ ب. استنتج بدلالة n عبارة المجموع T حيث $T = \frac{3U_0}{U_0 + 1} + \frac{3U_1}{U_1 + 1} + \dots + \frac{3U_n}{U_n + 1}$

التمرين الرابع (7 ن)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	2	1

(I) الجدول المقابل هو جدول تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي $g(x) = (x + 1)e^{-x} + 1$ 1. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $-1, 3 < \alpha < -1, 2$ 2. حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ (II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي $f(x) = \frac{3x}{1 + e^{-x}}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ 1. أ. بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ وفسر النتيجة هندسياً، ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ب. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{3g(x)}{(1 + e^{-x})^2}$ ج. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.2. بين أن $f(\alpha) = -3e^\alpha$ ثم استنتج حصراً للعدد $f(\alpha)$ 3. أ. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ ب. أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) 4. أ. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة O ب. أنشئ كلاً من (Δ) ، (T) و (C_f) ج. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx$

5. الدالة العددية h معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي $h(x) = \frac{3(2-x)e^2}{e^x + e^2}$

أ. بين أنه من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ ، $h(x) = f(2-x)$ ،

ب. اشرح كيفية إنشاء المنحنى الممثل للدالة h انطلاقاً من (C_f) . (لا يُطلب الإنشاء)

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول (4 ن)

كيس به 7 كريات متماثلة لا نفرّق بينها عند اللمس، منها ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام: 0، 0 و 2، كرتين خضراوين تحملان الرقمين: 2 و 5، كرتين حمراوين تحملان الرقمين 0 و 5. نسحب عشوائيا من الكيس أربع كريات في آن واحد، ونعتبر الحدثين الآتيين.

• A: "الحصول على أربعة أرقام تُشكّل العدد 2025".

• B: "الحصول على كرتين من نفس اللون بالضبط".

$$(I) \text{ 1. بين أن } P(A) = \frac{6}{35} \text{ و } P(B) = \frac{24}{35}$$

2. أحسب $P(A \cap B)$

(II) نضيف إلى الكيس k كرية تحمل العدد 2 حيث $k \in \mathbb{N}^*$ ، ونسحب عشوائيا من الكيس كرتين على التوالي دون إرجاع، ونعتبر X المتغير العشوائي الذي يُرفق كل إمكانية بعدد مرّات ظهور الرقم 2

1. أ. عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X

$$B. \text{ استنتج أن } E(X) = \frac{2k+4}{k+7}$$

2. عيّن أصغر قيمة ممكنة للعدد k حتى يكون $E(X) > 1$

التمرين الثاني (4 ن)

المتتالية العددية (U_n) معرفة ب: $U_0 = 3$ ، ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ، $U_{n+1} = 3U_n - 4n$

1. أحسب كلّاً من U_1 و U_2

2. استنتج أنّ المتتالية (U_n) ليست حسابية ولا هندسية.

3. المتتالية العددية (V_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $V_n = U_n - 2n - 1$

أ. بين أنّ المتتالية (V_n) هندسية أساسها 3 ثم استنتج عبارة V_n بدلالة n

ب. أكتب عبارة U_n بدلالة n ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

4. من أجل كلّ عدد طبيعي n نضع: $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

أ. بين أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n = 3^{n+1} + n^2 + 2n$

ب. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $S_n - U_n \equiv 0 [2]$

التمرين الثالث (5 ن)

نعتبر في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة (E) المعرفة كما يلي: $1962x - 977y = 8$

1. أ. بين أنّ العدد 977 أولي ثم استنتج أنّ المعادلة (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

ب. عيّن الحل الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق $x_0 + 5y_0 = 11$

ج. استنتج مجموعة حلول المعادلة (E)

2. نعتبر L عددا طبيعيا يكتب $\overline{\alpha\gamma\gamma\beta\beta\alpha}$ في نظام التعداد الذي أساسه 4 حيث α ، β و γ تشكل بهذا الترتيب حدودا متتابعة من متتالية حسابية والثنائية $(\alpha; \beta)$ حل للمعادلة (E) .
 • عين كلاً من α ، β و γ ثم أكتب L في النظام العشري.
3. حلل العدد 2025 إلى جداء عوامل أولية ثم استنتج قيم العدد الطبيعي n التي تحقق $2025 \equiv 0 [n^3]$
4. نضع : $PGCD(a; b) = d$ و $PPCM(a; b) = m$ حيث $(a; b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
 • عين كل الثنائيات $(a; b)$ حيث $a > b$ والتي تحقق
- $$\begin{cases} m = 6d \\ a^3 + b^4 = 2025 \end{cases}$$

التمرين الرابع (7 ن)

(I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = x \ln x - 1$

1. شكل جدول تغيرات الدالة g على $]0; +\infty[$

2. أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1,7 < \alpha < 1,8$

ب. استنتج حسب قيم x من $]0; +\infty[$ إشارة $g(x)$

(II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = (x-1)(\ln x - 1)$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{j}\| = 1cm$

1. أ. أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ وفسر النتيجة هندسياً ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$

ج. بين أن f متناقصة تماماً على $]0; \alpha[$ ومتزايدة تماماً على $[\alpha; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2. أ. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1

ب. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T)

3. أ. أنشئ كلاً من (T) و (C_f) . (تُعطي : $f(\alpha) \approx -0,33$).

ب. باستخدام (C_f) ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$

4. نعتبر λ عدداً حقيقياً حيث $0 < \lambda < 1$

أ. أكتب بدلالة λ العدد $\mathcal{A}(\lambda)$ المعروف بـ : $\mathcal{A}(\lambda) = \int_{\lambda}^1 [f(x) + x - 1] dx$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً.

ب. أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda)$

5. المتتالية العددية (ω_n) معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $\omega_n = 1 - \frac{f(e^{-n})}{n+1}$

• أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث $S_n = \omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_n$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

انتهى الموضوع الثاني





امتحان البكالوريا التجريبي

المدرسة العليا للأساتذة بورقلة
مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية
دورة أفريل 2025
الشعبة: تقني رياضي
المادة: رياضيات
المدة: 4 ساعات ونصف

الإجابة النموذجية + سلم التنقيط

شكر وعرفان

باقية من الشكر والعرفان للطلبة الآتية أسماؤهم على مجهوداتهم المبذولة خلال عملية التصحيح وكذلك على ملاحظاتهم القيمة التي ساهمت في إنجاز هذا العمل لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا.

- كوثر بن عطاء الله
- لؤي دغوم
- مريم بلعيفة
- مسعودة باوية
- معتز لصفر
- هالة قصة
- دعاء عرار

- رضوان أحودة
- منال حجاج
- عمرة طويل
- جمانة بوعرقية
- رميصاء بن ساسية
- فاطمة الزهراء زيتوني
- كوثر بدر

رئيس لجنة التصحيح

إجابة نموذجية مقترحة للموضوع الأول

التمرين الأول (4 ن)

1. حساب احتمال كل حدث من الأحداث A ، B و C
 أ. A : "أعضاء اللجنة من نفس الجنس".

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{عدد الإمكانيات}} \\ &= \frac{A_5^3 + A_4^3}{A_9^3} \\ &= \frac{84}{504} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

ب. B : "عُمر كاتباً للجنة".

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{\text{عدد عناصر } B}{\text{عدد الإمكانيات}} \\ &= \frac{A_1^1 \times A_8^2}{A_9^3} \\ &= \frac{56}{504} \\ &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

ج. C : "عُمر عضو في اللجنة".

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{\text{عدد عناصر } C}{\text{عدد الإمكانيات}} \\ &= \frac{3A_1^1 \times A_8^2}{A_9^3} \\ &= \frac{168}{504} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

2. تبين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{42}$ ، ثم استنتاج $P(A \cup B)$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} - \frac{1}{42} \\ &= \frac{16}{63} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{A_1^1 \times A_4^2}{A_9^3} \\ &= \frac{12}{504} \\ &= \frac{1}{42} \end{aligned}$$

3. أ. تبين أن $P(X=1) = \frac{5}{14}$ و $P(X=2) = \frac{10}{21}$

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{3A_4^1 \times A_5^2}{A_9^3} \\ &= \frac{240}{504} \\ &= \frac{10}{21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=1) &= \frac{3A_5^1 \times A_4^2}{A_9^3} \\ &= \frac{180}{504} \\ &= \frac{5}{14} \end{aligned}$$

ب. تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم استنتاج أمله الرياضي $E(X)$
مجموعة قيم المتغير العشوائي هي $\{0; 1; 2; 3\}$ ، ولدنا

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \frac{A_5^3}{A_9^3} \\ &= \frac{60}{504} \\ &= \frac{5}{42} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=0) &= \frac{A_4^3}{A_9^3} \\ &= \frac{24}{504} \\ &= \frac{1}{21} \end{aligned}$$

وبالتالي

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{21}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{5}{42}$	1

وعندئذ نستنتج أن

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{21} + 1 \times \frac{5}{14} + 2 \times \frac{10}{21} + 3 \times \frac{5}{42} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

ج. حساب احتمال الحدث $(\log X > 0)$

$$\begin{aligned} P(\log X > 0) &= P(X > 10^0) \\ &= P(X > 1) \\ &= P(X=2) + P(X=3) \\ &= \frac{10}{21} + \frac{5}{42} \\ &= \frac{25}{42} \end{aligned}$$

التمرين الثاني (4 ن)

1. أ. دراسة بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13 تبعا لقيم العدد الطبيعي n لدينا

$$\begin{cases} 3^0 \equiv 1 [13] \\ 3^1 \equiv 3 [13] \\ 3^2 \equiv 9 [13] \\ 3^3 \equiv 1 [13] \end{cases}$$

وعليه من أجل كل عدد طبيعي k لدينا

$$\begin{cases} 3^{3k} \equiv 1 [13] \\ 3^{3k+1} \equiv 3 [13] \\ 3^{3k+2} \equiv 9 [13] \end{cases}$$

- ب. استنتاج باقي القسمة الإقليدية للعدد $(3^{1962})^{2025}$ على 13 لدينا

$$1962 = 3 \times 654$$

ومنه

$$3^{1962} \equiv 1 [13]$$

وعليه

$$\begin{aligned} (3^{1962})^{2025} &\equiv 1^{2025} [13] \\ &\equiv 1 [13] \end{aligned}$$

2. تبين أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، العدد $7 \times 42^{3n} - 2 \times 55^{3n+1} + 1962$ مضاعف لـ 13

لدينا $1962 \equiv 12 [13]$	لدينا $\begin{aligned} 42 &\equiv 3 [13] \\ \text{وعليه من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N} \text{ لدينا} \\ 42^{3n} &\equiv 3^{3n} [13] \\ &\equiv 1 [13] \end{aligned}$	لدينا $\begin{aligned} 55 &\equiv 3 [13] \\ \text{وعليه من أجل كل } n \text{ من } \mathbb{N} \text{ لدينا} \\ 55^{3n+1} &\equiv 3^{3n+1} [13] \\ &\equiv 3 [13] \end{aligned}$
------------------------------------	---	---

وعليه

$$\begin{aligned} 7 \times 42^{3n} - 2 \times 55^{3n+1} + 1962 &\equiv 7 \times 1 - 2 \times 3 + 12 [13] \\ &\equiv 0 [13] \end{aligned}$$

وبالتالي من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، العدد $7 \times 42^{3n} - 2 \times 55^{3n+1} + 1962$ مضاعف لـ 13

3. تعيين الأعداد الطبيعية n التي تحقق $n^2 + 29^{3n+1} \times 2n + 16^{3n+2} \equiv 0 [13]$

من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} n^2 + 29^{3n+1} \times 2n + 16^{3n+2} &\equiv n^2 + 3^{3n+1} \times 2n + 3^{3n+2} [13] \\ &\equiv n^2 + 3 \times 2n + 9 [13] \\ &\equiv (n+3)^2 [13] \end{aligned}$$

ومنه

$$(n+3)^2 \equiv 0 [13]$$

وبما أن 13 عدد أولي فإن

$$n+3 \equiv 0 [13]$$

وبالتالي

$$n \equiv 10 [13]$$

ومنه $n = 13k + 10$ حيث $k \in \mathbb{N}$ 4. تعيين كل الثنائيات $(x; y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي تحقق ما يلي

$$\begin{cases} 3^x + 3^y \equiv 5 [13] \\ x < y < 11 \\ PGCD(x; y) = 1 \end{cases}$$

نعتبر k و k' عددان من $\mathbb{N}$ ، عندئذ لدينا

$$3^{3k+2} + 3^{3k'} \equiv 10 [13]$$

$$3^{3k+2} + 3^{3k'+1} \equiv 12 [13]$$

$$3^{3k+2} + 3^{3k'+2} \equiv 5 [13]$$

$$3^{3k+1} + 3^{3k'} \equiv 4 [13]$$

$$3^{3k+1} + 3^{3k'+1} \equiv 6 [13]$$

$$3^{3k+1} + 3^{3k'+2} \equiv 12 [13]$$

$$3^{3k} + 3^{3k'} \equiv 2 [13]$$

$$3^{3k} + 3^{3k'+1} \equiv 4 [13]$$

$$3^{3k} + 3^{3k'+2} \equiv 10 [13]$$

وعليه $3^x + 3^y \equiv 5 [13]$ تكافئ

$$\begin{cases} x = 3k + 2 & ; k \in \mathbb{N} \\ y = 3k' + 2 & ; k' \in \mathbb{N} \end{cases}$$

وبما أن $x < y < 11$ و $PGCD(x; y) = 1$ فإن مجموعة الثنائيات $(x; y)$ هي $\{(2; 5); (5; 8)\}$

المتمرن الثالث (5 ن)

I 1. البرهان بالتراجع أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $U_n > 2$ • نرسم الخاصية " $U_n > 2$ " بالرمز $P(n)$.• نتحقق من صحة $P(0)$

لدينا

$$U_0 = 3$$

ومنه

$$U_0 > 2$$

وعليه $P(0)$ صحيحة.• من أجل عدد طبيعي k نفترض صحة $P(k)$ ونبرهن صحة $P(k+1)$.

لدينا

$$U_k > 2$$

ومنه

$$U_k + 4 > 6$$

وعليه

$$\frac{1}{U_k + 4} < \frac{1}{6}$$

وعليه

$$-\frac{18}{U_k + 4} > -3$$

وبالتالي

$$5 - \frac{18}{U_k + 4} > 5 - 3$$

أي

$$U_{k+1} > 2$$

ومنه $P(k+1)$ صحيحة.• وحسب مبدأ الاستدلال بالتراجع نستنتج أن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n .2. دراسة اتجاه تغير (U_n) ثم استنتاج أنها متقاربة.من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} U_{n+1} - U_n &= 5 - \frac{18}{U_n + 4} - U_n \\ &= \frac{-U_n^2 + U_n + 2}{U_n + 4} \\ &= \frac{(2 - U_n)(U_n + 1)}{U_n + 4} \end{aligned}$$

وبما أن

$$\begin{cases} 2 - U_n < 0 \\ U_n + 1 > 0 \\ U_n + 4 > 0 \end{cases}$$

فإن

$$U_{n+1} - U_n < 0$$

ومنه (U_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.استنتاج أن (U_n) متقاربة. لدينا• (U_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$ • من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا $U_n > 2$ ، وعليه (U_n) محدودة من الأسفل بالعدد 2. وبالتالي (U_n) متقاربة.1. (II) تبين أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم كتابة عبارة V_n بدلالة n من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= \frac{U_{n+1} - 2}{U_{n+1} + 1} \\ &= \frac{5 - \frac{18}{U_n + 4} - 2}{5 - \frac{18}{U_n + 4} + 1} \\ &= \frac{\frac{3U_n - 6}{U_n + 4}}{\frac{6U_n + 6}{U_n + 4}} \\ &= \frac{3(U_n - 2)}{6(U_n + 1)} \\ &= \frac{1}{2}V_n \end{aligned}$$

ومنه المتتالية (V_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، ومن أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} V_n &= V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-0} \\ &= \frac{U_0 - 2}{U_0 + 1} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

2. تبين أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $U_n = \frac{2 + V_n}{1 - V_n}$ ثم استنتاج $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$V_n = \frac{U_n - 2}{U_n + 1}$$

ومنه

$$(U_n + 1) V_n = U_n - 2$$

وعليه

$$U_n V_n + V_n = U_n - 2$$

وبالتالي

$$U_n V_n - U_n = -V_n - 2$$

ومنه

$$U_n (V_n - 1) = -V_n - 2$$

وبما أنّ $V_n \neq 1$ فإنّ

$$U_n = \frac{-V_n - 2}{V_n - 1}$$

أي

$$U_n = \frac{V_n + 2}{1 - V_n}$$

وبالتالي

$$U_n = \frac{\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}{1 - \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

وبما أنّ $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإنّ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ ، وعليه $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$

3. أ. حساب بدلالة n المجموع S حيث $S = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ لدينا $S = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-0+1}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] \end{aligned}$$

ب. استنتاج بدلالة n عبارة المجموع T حيث $T = \frac{3U_0}{U_0+1} + \frac{3U_1}{U_1+1} + \dots + \frac{3U_n}{U_n+1}$ من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{U_n - 2}{U_n + 1} \\ &= \frac{U_n + 2U_n - 2U_n - 2}{U_n + 1} \\ &= \frac{3U_n}{U_n + 1} - \frac{2(U_n + 1)}{U_n + 1} \\ &= \frac{3U_n}{U_n + 1} - 2 \\ \frac{3U_n}{U_n + 1} &= V_n + 2 \end{aligned}$$

ومنه

وعليه

$$\begin{aligned} T &= V_0 + 2 + V_1 + 2 + \dots + V_n + 2 \\ &= V_0 + V_1 + \dots + V_n + 2 + 2 + \dots + 2 \\ &= S + 2(n+1) \\ &= \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right] + 2n + 2 \\ &= 2n - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+2} + \frac{5}{2} \end{aligned}$$

التمرين الرابع (7 ن)

1. (I) تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $-1,3 < \alpha < -1,2$ لدينا

- $g(x) > 0$ على $[0; +\infty[$
- g مستمرة على $]-\infty; 0]$
- g متزايدة تماماً على $]-\infty; 0]$
- $g(-1,3) \times g(-1,2) < 0$ لأن

$$g(-1,3) \approx -0,1$$

$$g(-1,2) \approx 0,3$$

وبالتالي المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $-1,3 < \alpha < -1,2$

2. تحديد إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x لدينا

- $g(x) > 0$ على $[0; +\infty[$
- g متزايدة تماماً على $]-\infty; 0]$
- $g(\alpha) = 0$

ومنه

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II) 1. أ. تبين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ وتفسير النتيجة هندسيا، ثم حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{1 + e^{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3xe^x}{e^x + 1} \\ &= 0\end{aligned}$$

لأن

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases}$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ (حامل محور الفواصل) مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$ ولدينا

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \end{cases}$$

ب. تبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{3g(x)}{(1 + e^{-x})^2}$

f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{3(1 + e^{-x}) - (-e^{-x}) \times 3x}{(1 + e^{-x})^2} \\ &= \frac{3 + 3e^{-x} + 3xe^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} \\ &= \frac{3[(x + 1)e^{-x} + 1]}{(1 + e^{-x})^2} \\ &= \frac{3g(x)}{(1 + e^{-x})^2}\end{aligned}$$

ج. استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها.

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا

$$(1 + e^{-x})^2 > 0$$

وعليه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $3g(x)$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

- $f'(x) < 0$ على $]-\infty; \alpha[$ و $f'(\alpha) = 0$ ومنه f متناقصة تماما على $]-\infty; \alpha]$
- $f'(x) < 0$ على $]\alpha; +\infty[$ و $f'(\alpha) = 0$ ومنه f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty]$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f(x)$	0	$f(\alpha)$	$+\infty$

2. تبين أن $f(\alpha) = -3e^\alpha$ ثم استنتاج حصر للعدد $f(\alpha)$

لدينا

$$f(\alpha) = \frac{3\alpha}{1 + e^{-\alpha}}$$

ولدينا

$$g(\alpha) = 0$$

أي

$$(1 + \alpha)e^{-\alpha} + 1 = 0$$

ومنه

$$(1 + \alpha)e^{-\alpha} = -1$$

وعليه

$$1 + \alpha = -e^\alpha$$

وبالتالي

$$\alpha = -e^\alpha - 1$$

وبالتعويض نجد

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \frac{3(-e^\alpha - 1)}{1 + e^{-\alpha}} \\ &= -\frac{3(e^\alpha + 1)}{1 + e^{-\alpha}} \\ &= -\frac{3e^\alpha(e^\alpha + 1)}{e^\alpha + 1} \\ &= -3e^\alpha \end{aligned}$$

ولدينا

$$-1,3 < \alpha < -1,2$$

ومنه

$$-3e^{-1,2} < -3e^\alpha < -3e^{-1,3}$$

أي

$$-3e^{-1,2} < f(\alpha) < -3e^{-1,3}$$

3. أ. تبين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3x$ مقارب مائل للنحنى (C_f) عند $+\infty$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا

$$\begin{aligned} f(x) - 3x &= \frac{3x}{1 + e^{-x}} - 3x \\ &= \frac{3x - 3x - 3xe^{-x}}{1 + e^{-x}} \\ f(x) - 3x &= \frac{-3xe^{-x}}{1 + e^{-x}} \end{aligned}$$

وبما أنّ

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow +\infty} (-3xe^{-x}) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (3te^t) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^t = 0 \end{cases}$$

فإنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 3x] = 0$ ، وبالتالي المستقيم ذو المعادلة $y = 3x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$

ب. دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$ لدينا

$$f(x) - 3x = \frac{-3xe^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

وبما أنّ

$$\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} > 0$$

فإنّ إشارة الفرق من $-3x$ ، وعندئذ لدينا

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - 3x$	+	0	-

وبالتالي

- (C_f) يقع فوق (Δ) على $]-\infty; 0[$
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0; 0)$
- (C_f) يقع تحت (Δ) على $]0; +\infty[$

4. أ. كتابة معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة O


f قابلة للاشتقاق عند 0 ومنه (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه $f'(0)$ حيث

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

وبما أنّ $f(0) = 0$ و $f'(0) = \frac{3}{2}$ فإنّ

$$(T) : y = \frac{3}{2}x$$

ب. إنشاء كُلا من (Δ) ، (T) و (C_f)



ج. مناقشة عدد حلول المعادلة $f(x) = mx$ حسب قيم الوسيط الحقيقي m

حلول المعادلة بيانها هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) حيث

$$(\Delta_m) : y = mx$$

من أجل كل m من $\mathbb{R}$ لدينا $O(0; 0) \in (\Delta_m)$ وعندئذ لدينا

عدد حلول المعادلة	قيم m
حل واحد	$m \in]-\infty; 0]$
حلان	$m \in \left] 0; \frac{3}{2} \right[$
حل واحد	$m = \frac{3}{2}$
حلان	$m \in \left] \frac{3}{2}; 3 \right[$
حل واحد	$m \in [3; +\infty[$

5. أ. تبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $h(x) = f(2 - x)$

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $(2 - x) \in D_f$ ولدينا

$$\begin{aligned} f(2 - x) &= \frac{3(2 - x)}{1 + e^{x-2}} \\ &= \frac{3(2 - x)e^2}{e^x + e^2} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

ب. شرح كيفية إنشاء المنحنى الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f) .

• من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا $(2 - x) \in \mathbb{R}$

• من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا $h(x) = f(2 \times 1 - x)$

وبالتالي المنحنى الممثل للدالة h هو نظير (C_f) بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $x = 1$.

سلم تنقيط الموضوع الأول

التمرين الأول (4 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
أ.1	0,5
ب.1	0,5
ج.1	0,5
2	$0,25 + 0,25$
أ.3	$0,15 + 0,5$
ب.3	0,75
ج.3	0,25

التمرين الثاني (4 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
أ.1	1
ب.1	1
2	0,75
3	0,5
4	0,75

التمرين الثالث (5 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
1 (I)	1
2 (I)	$0,25 + 0,75$
1 (II)	$0,25 + 0,5$
2 (II)	$0,25 + 0,5$
أ.3 (II)	1
ب.3 (II)	0,5

التمرين الرابع (7 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
1 (I)	0,5
2 (I)	0,5
أ.1 (II)	0,75
ب.1 (II)	0,5
ج.1 (II)	0,25 + 0,5
2 (II)	0,5
أ.3 (II)	0,5
ب.3 (II)	0,5
أ.4 (II)	0,5
ب.4 (II)	0,25 + 0,25 + 0,5
ج.4 (II)	0,25
أ.5 (II)	0,25
ب.5 (II)	0,5

إجابة نموذجية مقترحة للموضوع الثاني

التمرين الأول (4 ن)

(I) 1. تبين أن $P(A) = \frac{6}{35}$ و $P(B) = \frac{24}{35}$

$$P(B) = \frac{C_3^2 \times C_2^1 \times C_2^1 + 2C_2^2 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_7^4} \quad \left| \quad P(A) = \frac{C_2^2 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_7^4} \right.$$

$$= \frac{24}{35} \quad \left| \quad = \frac{6}{35} \right.$$

2. حساب $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = \frac{C_2^1 \times C_1^1 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^2 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^2 \times C_1^1 \times C_1^1}{C_7^4}$$

$$= \frac{4}{35}$$

(II) 1. أ. تعريف قانون احتمال المتغير العشوائي X

مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي $\{0; 1; 2\}$ وعندئذ لدينا
• في حالة $X = 0$

$$P(X = 0) = \frac{A_5^2}{A_{k+7}^2}$$

$$= \frac{20}{(k+7)(k+6)}$$

$$= \frac{20}{k^2 + 13k + 42}$$

• في حالة $X = 1$

$$P(X = 1) = \frac{2A_5^1 \times A_{k+2}^1}{A_{k+7}^2}$$

$$= \frac{2 \times 5(k+2)}{(k+7)(k+6)}$$

$$= \frac{10k + 20}{k^2 + 13k + 42}$$

• في حالة $X = 2$

$$P(X = 2) = \frac{A_{k+2}^2}{A_{k+7}^2}$$

$$= \frac{(k+2)(k+1)}{(k+7)(k+6)}$$

$$= \frac{k^2 + 3k + 2}{k^2 + 13k + 42}$$

ب. استنتاج أن $E(X) = \frac{2k+4}{k+7}$

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{20}{(k+7)(k+6)} + 1 \times \frac{10k+20}{(k+7)(k+6)} + 2 \times \frac{k^2+3k+2}{(k+7)(k+6)} \\ &= \frac{10k+20+2k^2+6k+4}{k^2+13k+42} \\ &= \frac{2k^2+16k+24}{k^2+13k+42} \\ &= \frac{2(k+2)(k+6)}{(k+7)(k+6)} \\ &= \frac{2k+4}{k+7} \end{aligned}$$

2. تعيين أصغر قيمة ممكنة للعدد k حتى يكون $E(X) > 1$ المتراجحة $E(X) > 1$ تكافئ

$$\frac{2k+4}{k+7} > 1$$

وتكافئ

$$2k+4 > k+7$$

وتكافئ

$$k > 3$$

وبالتالي أصغر قيمة ممكنة للعدد k هي 4.

التمرين الثاني (4 ن)

1. حساب U_2 و U_1 كلاً من

$$\begin{aligned} U_2 &= 3U_1 - 4 \times 1 \\ &= 3 \times 9 - 4 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_1 &= 3U_0 - 4 \times 0 \\ &= 3 \times 3 - 0 \\ &= 9 \end{aligned}$$

2. استنتاج أن المتتالية (U_n) ليست حسابية ولا هندسية. لدينا

$$\begin{aligned} 2U_1 &= 2 \times 9 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_0 + U_2 &= 3 + 23 \\ &= 26 \end{aligned}$$

ومنه

$$U_0 + U_2 \neq 2U_1$$

وعليه (U_n) ليست حسابية. ولدينا

$$\begin{aligned} U_1^2 &= 9^2 \\ &= 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_0 \times U_2 &= 3 \times 23 \\ &= 69 \end{aligned}$$

ومنه

$$U_0 \times U_2 \neq U_1^2$$

وعليه (U_n) ليست هندسية.

3. أ. تبين أن المتتالية (V_n) هندسية أساسها 3 ثم استنتج عبارة V_n بدلالة n
من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} V_{n+1} &= U_{n+1} - 2(n+1) - 1 \\ &= 3U_n - 4n - 2n - 2 - 1 \\ &= 3U_n - 6n - 3 \\ &= 3(U_n - 2n - 1) \\ &= 3V_n \end{aligned}$$

وعليه (V_n) هندسية أساسها 3 ، ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$V_n = V_0 \times 3^{n-0}$$

$$= 2 \times 3^n$$

ب. كتابة عبارة U_n بدلالة n ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} U_n &= V_n + 2n + 1 \\ &= 2 \times 3^n + 2n + 1 \end{aligned}$$

وبما أن $3 > 1$ فإن

$$\lim 3^n = +\infty$$

وبالتالي

$$\lim U_n = +\infty$$

4. أ. تبين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : S_n = 3^{n+1} + n^2 + 2n$
من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned} S_n &= U_0 + U_1 + \dots + U_n \\ &= V_0 + 2 \times 0 + 1 + V_1 + 2 \times 1 + 1 + \dots + V_n + 2n + 1 \\ &= V_0 + V_1 + \dots + V_n + 2(0 + 1 + \dots + n) + 1 + 1 + \dots + 1 \\ &= 2 \times \frac{3^{n-0+1} - 1}{3 - 1} + 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + 1 \times (n+1) \\ &= 3^{n+1} - 1 + n(n+1) + n + 1 \\ &= 3^{n+1} + n^2 + 2n \end{aligned}$$

ب. تعيين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $S_n - U_n \equiv 0 [2]$
لدينا

$$\begin{aligned} S_n - U_n &= 3^{n+1} + n^2 + 2n - (2 \times 3^n + 2n + 1) \\ &= 3 \times 3^n + n^2 + 2n - 2 \times 3^n - 2n - 1 \\ &= n^2 + 3^n - 1 \end{aligned}$$

وبما أن

$$3 \equiv 1 [2]$$

فإن

$$3^n \equiv 1 [2]$$

ومنه

$$\begin{aligned} S_n - U_n &\equiv n^2 + 1 - 1 [2] \\ &\equiv n^2 [2] \end{aligned}$$

وعليه

$$n^2 \equiv 0 [2]$$

وبما أن 2 عدد أولي فإنّ

$$n \equiv 0 [2]$$

عندئذ $n = 2k$ حيث $k \in \mathbb{N}$

التمرين الثالث (5 ن)

1. أ. تبين أنّ العدد 977 أولي ثمّ استنتاج أنّ المعادلة (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

لدينا $\sqrt{977} \approx 31,25$ ، وبما أنّ

$$13 \nmid 31$$

$$17 \nmid 31$$

$$19 \nmid 31$$

$$23 \nmid 31$$

$$29 \nmid 31$$

$$2 \nmid 31$$

$$3 \nmid 31$$

$$5 \nmid 31$$

$$7 \nmid 31$$

$$11 \nmid 31$$

فإنّ 977 عدد أولي.

الاستنتاج. بما أنّ 977 عدد أولي و 1962 لا يقبل القسمة على 977 فإنّ $PGCD(1962; 977) = 1$ ومنهالمعادلة (E) تقبل حلولاً في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

ب. تعيين الحلّ الخاص $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق $x_0 + 5y_0 = 11$

لدينا

$$x_0 + 5y_0 = 11$$

ومنه

$$x_0 = 11 - 5y_0$$

وبما أنّ $(x_0; y_0)$ حلّ للمعادلة (E) فإنّ

$$1962x_0 - 977y_0 = 8$$

أي

$$1962(11 - 5y_0) - 977y_0 = 8$$

ومنه

$$y_0 = 2$$

وعليه

$$x_0 = 11 - 5 \times 2$$

$$= 1$$

ج. استنتاج مجموعة حلول المعادلة (E)

لدينا

$$\begin{cases} 1962x - 977y = 8 \\ 1962x_0 - 977y_0 = 8 \end{cases}$$

ومنه

$$1962(x - x_0) - 977(y - y_0) = 0$$

وعليه

$$1962(x - 1) = 977(y - 2)$$

وبما أن $PGCD(1962; 977) = 1$ فإن $y - 2 \mid 1962$ وينتج عن ذلك أن

$$\begin{cases} y = 1962k + 2 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

ومنه

$$\begin{cases} x = 977k + 1 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

وبالتالي مجموعة حلول المعادلة هي S حيث

$$S = \{(977k + 1; 1962k + 2) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

2. تعيين كلاً من α ، β و γ ثم كتابة L في النظام العشري.

الثنائية $(\alpha; \beta)$ حل للمعادلة (E) معناه

$$\begin{cases} \alpha = 977k + 1 \\ \beta = 1962k + 2 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

وبما أن

$$\begin{cases} 0 < \alpha < 4 \\ 0 \leq \beta < 4 \end{cases}$$

فإن $k = 0$ ، وبالتالي $\alpha = 1$ و $\beta = 2$ ، وبما أن $\alpha + \gamma = 2\beta$ فإن

$$\begin{aligned} \gamma &= 2\beta - \alpha \\ &= 2 \times 2 - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

كتابة L على الشكل العشري

$$\begin{aligned} L &= \alpha \times 4^0 + \beta \times 4^1 + \beta \times 4^2 + \gamma \times 4^3 + \gamma \times 4^4 + \alpha \times 4^5 \\ &= 1 \times 4^0 + 2 \times 4^1 + 2 \times 4^2 + 3 \times 4^3 + 3 \times 4^4 + 1 \times 4^5 \\ &= 2025 \end{aligned}$$

3. تحليل العدد 2025 إلى جداء عوامل أولية ثم استنتاج قيم العدد الطبيعي n التي تحقق $1962 \equiv 0 [n^3]$ لدينا

2025	3
675	3
225	3
75	3
25	5
5	5
1	

ومنه $2025 = 3^4 \times 5^2$ ونستنتج أن قيم العدد الطبيعي n التي تحقق $1962 \equiv 0 [n^3]$ هي : 1 و 3

4. تعيين كل الثنائيات $(a; b)$ حيث $a > b$ والتي تحقق $m = 6d$ و $a^3 + b^4 = 2025$ لدينا

$$\begin{cases} m \times d = a \times b \\ a = d \times a' \\ b = d \times b' \\ PGCD(a'; b') = 1 \end{cases}$$

ومنه

$$\begin{cases} m = d \times a' \times b' \\ a = d \times a' \\ b = d \times b' \\ PGCD(a'; b') = 1 \end{cases}$$

وعليه

$$\begin{cases} d \times a' \times b' = 6d \\ (d \times a')^3 + (d \times b')^4 = 2025 \\ PGCD(a'; b') = 1 \end{cases}$$

وبالتالي

$$\begin{cases} a' \times b' = 6 \\ d^3 [(a')^3 + d(b')^4] = 2025 \\ d \in \{1; 3\} \\ PGCD(a'; b') = 1 \end{cases}$$

وينتج

$$\begin{cases} (a'; b') \in \{(6; 1); (3; 2)\} \\ d^3 [(a')^4 + d(b')^3] = 2025 \\ d \in \{1; 3\} \end{cases}$$

• في حالة $d = 1$ الجملة غير محققة لأن

$$\begin{cases} 6^4 + 1^3 < 2025 \\ 3^4 + 2^3 < 2025 \end{cases}$$

• في حالة $d = 3$ لدينا

$$\begin{cases} (a'; b') \in \{(6; 1); (3; 2)\} \\ (a')^4 + 3(b')^4 = 75 \end{cases}$$

ومنه $a' = 3$ و $b' = 2$ ، وعليه $a = 9$ و $b = 6$

التمرين الرابع (7 ن)

I) 1. تشكيل جدول تغيرات الدالة g على $]0; +\infty[$ لدينا

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x - 1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln x - 1) = +\infty$$

g قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ولدينا

$$\begin{aligned} g'(x) &= 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} \\ &= \ln x + 1 \end{aligned}$$

المعادلة

$$g'(x) = 0$$

تكافئ

$$\ln x + 1 = 0$$

وتكافئ

$$x = e^{-1}$$

وعندئذ لدينا

x	0	e^{-1}	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	-1	$-e^{-1} - 1$	$+\infty$

2. أ. تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1,7 < \alpha < 1,8$

• $g(x) < 0$ على $]0; e^{-1}]$

• g مستمرة على $[e^{-1}; +\infty[$

• g متزايدة تماماً على $[e^{-1}; +\infty[$

• لدينا

$$g(1,7) \approx -0,1$$

$$g(1,8) \approx 0,06$$

ومنه $g(1,7) \times g(1,8) < 0$

عندئذ نستنتج أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1,7 < \alpha < 1,8$.

ب. استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $]0; +\infty[$

لدينا

• $g(x) < 0$ على $]0; e^{-1}]$

• g متزايدة تماماً على $[e^{-1}; +\infty[$

• $g(\alpha) = 0$

وعليه

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$		$-$	$+$

(II) 1. أ. حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وتفسير النتيجة هندسياً ثم حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-1)(\ln x - 1)]$$

$$= +\infty$$

لأنّ

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x-1)(\ln x - 1)]$$

$$= +\infty$$

لأنّ

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (حامل محور الترتيب) (C_f) مقارب لـ

ب. تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$
 f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ولدينا

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times (\ln x - 1) + \frac{1}{x} \times (x - 1) \\ &= \frac{x(\ln x - 1)}{x} + \frac{x - 1}{x} \\ &= \frac{x \ln x - 1}{x} \\ &= \frac{g(x)}{x} \end{aligned}$$

ج. تبين أن f متناقصة تماما على $]0; \alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ ثم تشكيل جدول تغيراتها.
 من أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا

$$x > 0$$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $g(x)$ وعندئذ لدينا

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		-	+

• $f'(x) < 0$ على $]0; \alpha[$ و $f'(\alpha) = 0$ ومنه f متناقصة تماما على $]0; \alpha]$
 • $f'(x) < 0$ على $[\alpha; +\infty[$ و $f'(\alpha) = 0$ ومنه f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

2. أ. كتابة معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فصلتها 1

f قابلة للاشتقاق عند 1 ومنه (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه $f'(1)$ حيث
 $(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

ولدينا

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times \ln 1 - 1}{1} \\ &= -1 \end{aligned} \right| \begin{aligned} f(1) &= (1 - 1)(\ln 1 - 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

وبالتالي

$$(T) : y = -x + 1$$

ب. دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T)


من أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا

$$\begin{aligned} f(x) - (-x + 1) &= (x - 1)(\ln x - 1) - (-x + 1) \\ &= (x - 1)(\ln x - 1) + (x - 1) \\ &= (x - 1)(\ln x - 1 + 1) \\ &= (x - 1) \ln x \end{aligned}$$

ومنه

x	0	1	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+
$\ln x$	-	0	+
$f(x) - (-x + 1)$	+	0	+

وبالتالي

• (C_f) يقع فوق (T) على $]0; 1[\cup]1; +\infty[$ • (C_f) يقطع (T) في النقطة $A(1; 0)$ 3. أ. إنشاء كُلاً من (T) و (C_f) .ب. مناقشة عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$ حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول المعادلة بيانها هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ_m) حيث

$$(\Delta_m): y = -x + m$$

وعندئذ لدينا

عدد حلول المعادلة	قيم m
لا توجد حلول	$m \in]-\infty; 1[$
حل واحد	$m = 1$
حلان	$m \in]1; +\infty[$

4. أ. كتابة بدلالة λ العدد $A(\lambda)$ المعروف بـ: $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 [f(x) + x - 1] dx$ ، ثم تفسير النتيجة هندسياً.

$$\begin{aligned}
 A(\lambda) &= \int_{\lambda}^1 [f(x) + x - 1] dx \\
 &= \int_{\lambda}^1 [(x - 1) \ln x] dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}(\lambda) &= \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_{\lambda}^1 - \int_{\lambda}^1 \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx \\
&= \left(\lambda - \frac{\lambda^2}{2} \right) \ln \lambda - \left[\left(\frac{x^2}{4} - x \right) \right]_{\lambda}^1 \\
&= \left(\lambda - \frac{\lambda^2}{2} \right) \ln \lambda + \frac{\lambda^2}{4} - \lambda + \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

التفسير. من أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا $f(x) - (-x + 1) \geq 0$ ، ومنه $\mathcal{A}(\lambda)$ هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمماس (T) والمستقيمين ذوا المعادلتين $x = 1$ و $x = \lambda$

ب. حساب $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda)$

لدينا

$$\left(\lambda - \frac{\lambda^2}{2} \right) \ln \lambda + \frac{\lambda^2}{4} - \lambda + \frac{3}{4} = \lambda \ln \lambda - \frac{1}{2} \lambda^2 \ln \lambda + \frac{\lambda^2}{4} - \lambda + \frac{3}{4}$$

وبما أن

$$\begin{cases} \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\lambda \ln \lambda) = 0 \\ \lim_{\lambda \rightarrow 0} (\lambda^2 \ln \lambda) = 0 \end{cases}$$

فإن

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathcal{A}(\lambda) = \frac{3}{4}$$

5. حساب بدلالة n المجموع S_n حيث $S_n = \omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_n$ ثم استنتاج $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

من أجل كل n من $\mathbb{N}$ لدينا

$$\begin{aligned}
\omega_n &= 1 - \frac{f(e^{-n})}{n+1} \\
&= 1 - \frac{(e^{-n} - 1)(\ln e^{-n} - 1)}{n+1} \\
&= 1 - \frac{(e^{-n} - 1)(-n - 1)}{n+1} \\
&= 1 + \frac{(e^{-n} - 1)(n+1)}{n+1} \\
&= e^{-n}
\end{aligned}$$

وعليه

$$\begin{aligned}
S_n &= \omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_n \\
&= 1 + e^{-1} + \dots + e^{-n} \\
&= 1 \times \frac{1 - (e^{-1})^{n-0+1}}{1 - e^{-1}} \\
&= \frac{1 - e^{-n-1}}{1 - e^{-1}} \\
&= \frac{e - e^{-n}}{e - 1}
\end{aligned}$$

وبما أنّ

$$\lim e^{-n} = \lim \frac{1}{e^n} \\ = 0$$

فإنّ

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{e}{e-1}$$

سلم تنقيط الموضوع الثاني

التمرين الأول (4 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
1 (I)	$0,75 + 0,75$
2 (I)	$0,75$
أ.1 (II)	1
ب.1 (II)	$0,5$
2 (II)	$0,25$

التمرين الثاني (4 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
1	$0,25 + 0,25$
2	$0,5$
أ.3	$0,5 + 0,75$
ب.3	$0,25 + 0,25$
أ.4	$0,75$
ب.4	$0,5$

التمرين الثالث (5 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
أ.1	$0,5 + 0,5$
ب.1	$0,5$
ج.1	1
2	1
3	$0,5 + 0,5$
4	$0,5$

التمرين الرابع (7 ن)

ترقيم السؤال	التنقيط
(I) 1	0,5
(I) 2.أ	0,5
(I) 2.ب	0,5
(II) 1.أ	0,75
(II) 1.ب	0,5
(II) 1.ج	0,25 + 0,5
(II) 2.أ	0,5
(II) 2.ب	0,5
(II) 3.أ	0,25 + 0,5
(II) 3.ب	0,25
(II) 4.أ	0,25 + 0,5
(II) 4.ب	0,25
(II) 5	0,25 + 0,25

■ انتهى

يكتمل الملف بملاحظات القراء الكرام، لذلك في حالة وجود أي خلل في الملف يرجى مراسلتنا به بغية تصويبه لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا وذلك عن طريق البريد الإلكتروني prof.ardjani@gmail.com وجزاكم الله خيرا