

التمرين الأول : (05 نقاط)

تعتبر الكرة الأرضية كوكبا نشطا يخضع لقوى داخلية تعتبر مصدرا لمختلف الأنشطة التكتونية. تمكن علماء الجيولوجيا من تحديد جميع طبقات الكرة الأرضية و ذلك باستعمال طرق مباشرة و غير مباشرة .

الوثيقة توضح منحنى تغير سرعة انتشار الموجات الزلزالية تم رصده في منطقة ما من سطح الأرض.

(1) تعرف على الطبقات المحصورة ما بين : (0 - 30 كلم) ، (30 - 125 كلم) ، (125 - 225) . ثم حدد المنطقة التي رصدت منها هذه الموجات.

(2) علل العبارات التالية :

(a) الأرض كوكب ذو بنية متميزة.

(b) سرعة الموجات S من 2900 إلى 5100 كلم من عمق الأرض منعدمة .

(c) سهولة التمييز بين الليتوسفير و الأسيتينوسفير.

(d) لصخر البازلت بنية ميكروليتية.

(3) اشرح في نص علمي كيف سمح استغلال الموجات الزلزالية ببناء نموذج للكرة الأرضية. دعم إجابتك برسم تخطيطي يبرز الأغلفة ، الحالة الفيزيائية و الإنقطاعات.

التمرين الثاني : (7 نقاط)

عرفت المحاولات الأولى لزرع الطعم عند الإنسان إخفاقات كبيرة حيث لوحظ في حالات كثيرة تدمير العضو أو النسيج المزروع. لتحديد بعض مظاهر و أسباب رفض الطعم نقدم لك الدراسات التالية :


الجزء الأول :

أنجزت دراسة حول نسبة نجاح عمليات تطعيم الجلد حسب درجة القرابة بين المعطي و المتلقي و التي ترتبط بدرجة تلاؤم جزيئات CMH. الوثيقة 1 - أ تقدم نتائج هذه الدراسة .

صلة القرابة	أليلات مركب CMH	عدد عمليات التطعيم المنجزة	عدد حالات قبول جسم المتلقي للطعم	عدد حالات رفض جسم المتلقي للطعم
توأمان حقيقيان	تطابق الحليلات	23	23	0
وجود صلة قرابة	تشابه في بعض الأليلات	612	303	309
بدون صلة قرابة	اختلاف مهم في الأليلات	12	0	12

الوثيقة 1. أ

أنجز Peter Brain Medawar تجارب تطعيم الجلد على سلالات أرانب مختلفة وراثيا : أرانب من السلالة A (A1 و A2) و أرانب من السلالة B (B1 ، B2 ، B3 و B4). الوثيقة 1 - ب تقدم النتائج المحصل عليها.



1. استخراج معلا إجابتك :


- الشرط الضروري لقبول الطعم.

- طبيعة و خصائص الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم.

الجزء الثاني :

قصد التعرف على الآليات التي تسمح برفض الطعم تم استخلاص خلايا الطعم من أرنب معطي من السلالة A و سُمها بالكروم المشع الذي ينفذ داخل خلايا الطعم و يثبت على بروتيناتها و لا يتحرر إلا عند تدمير هذه الخلايا. توضع هذه الخلايا في أربع أوساط مختلفة ثم يضاف إليها خلايا مناعية مستخلصة من فأر متلقي من السلالة B.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 ظروف هذه التجربة، بينما يمثل الشكل (2) نتائج قياس كمية الكروم المشع ^{51}Cr المحرر في كل وسط.



1. قدم تفسيراً للنتائج الموضحة في الشكل - ب من الوثيقة - 2 .
2. وضح مستعينا برسم تخطيطي وظيفي الآلية التي سمحت بالحصول على نتيجة الوسط 3.
3. في حالة زرع بعض الأعضاء يتم مساعدة جسم المتلقي على قبول الطعم بإخضاعه لعلاج بمادة السيكلوسبورين (Cyclosporine) التي تكبح تركيب جزيئات الأنترلوكين 2 و كذا مستقبلاتها الغشائية .
- وضح كيف يؤدي علاج المتلقي بمادة السيكلوسبورين إلى مساعدة عضويته على قبول الطعم.

التمرين الثالث: (8 نقاط)


تتدخل المراكز العصبية في مختلف الاحساسات التي يشعر بها الفرد، وتلعب المشابك دوراً هاماً في إيصال هذه الاحساسات ليتم دمجها بعد ذلك، إلا أن هناك جزيئات خارجية كيميائية مثل المخدرات تؤثر على هذه المشابك فتحدث خللاً في عملها.

الكوديين Codeine ، مسكن يستعمل في المجال الطبي للتخفيف من بعض الآلام ، يؤثر على مستوى الدماغ و النخاع الشوكي. بغرض التعرف على طريقة تأثيره ، نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

تمثل الوثيقة 1 مجموعة من النهايات العصبية للعصبونات المتدخلة في الإحساس بالألم و المتواجدة على مستوى القرنين الخلفيين للمادة الرمادية من النخاع الشوكي حيث :

- العصبون D عصبون حسي جلدي.
- العصبون L عصبون وارد إلى الدماغ.
- العصبون S عصبون صادر من الدماغ.



بواسطة الكترودات مجهرية (R) نسجل الكمونات الغشائية للعصبونات السابقة في ظروف تجريبية مختلفة كما هو موضح في الجدول التالي:

الشروط التجريبية	تغيرات الكمونات الغشائية على مستوى إلكترودات الاستقبال (R)				الاحساس الناتج
	R4	R3	R2	R1	
1 حقن الإنكيفالين					عدم الاحساس بالألم
2 حقن المادة P					الاحساس بالألم
3 حقن السيروتونين					عدم الاحساس بالألم

1- حدد بالاعتماد على التسجيلات الموضحة في الجدول أنواع المشابك و المواد المؤثرة على مستواها في الوثيقة (1) مع التعليل .


2- يؤدي تنبيه العصبون (D) في التجربة (4) إلى الإحساس بالألم بينما التنبيهات المتتالية للعصبونين (S) و (D) على الترتيب في التجربة (5) إلى عدم الإحساس بالألم .

-. قدم تفسيراً مفصلاً للنتائج المحصل في التجريبتين (4) و (5)

3- اقترح فرضيتين حول آلية تأثير الكوديين Codeine في التخفيف من الإحساس بالألم.

الجزء الثاني :


للتحقق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين نقدم معطيات الوثيقة (2) حيث : الشكل أ : يوضح جزيئة الكوديين Codeine و الإنكيفالين. بينما الشكل ب : يبين آلية تأثر الإنكيفالين.



- صادق باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2 على صحة الفرضيتين السابقتين.

الجزء الثالث: أنجز رسم تخطيطي وظيفي يوضح مسار الرسالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم و مبرز دور مختلف البروتينات في ذلك.

العلامة		عناصر الاجابة			
المجموع	مجزأة				
1.25	0.25 × 4	التمرين الأول : (5 نقاط) (1) التعرف على الطبقات :			
		من 0 إلى 30 كلم	قشرة أرضية	من 0 إلى 125 كلم	ليتوسفير
	0.25	من 30 إلى 125 كلم	جزء علوي من البرنس العلوي	من 125 إلى 225	النطاق LVZ
المنطقة التي رصدت منها هذه الموجات : القارة .					
1	0.25 × 4	(2) تحليل العبارات :			
		العبارة	تعليها		
		a	تتشكل من طبقات ذات خصائص فيزيائية و كيميائية مختلفة.		
		b	لأن النواة الخارجية سائلة و الموجات S لا تنتشر في الأوساط السائلة.		
		c	عن طريق النطاق LVZ الذي يفصل بينهما حيث تكون فيه سرعة الموجات منخفضة و البيريدوتيت مطاطي.		
d	لأنه ينتج عن التبرد السريع للماغما على السطح.				
1.75	0.25 <				




التمرين الثاني : الجزء الأول : 1. استخراج :			
3	1	التعليل :	قبول كل الطعوم عندما كان المعطي والمستقبل توأمان حقيقيين يحملان أليالات CMH متطابقة.
		وجود توافق نسجي بين المعطي والمستقبل (تمائل CMH).	الشرط الضروري لقبول الطعم
	1	التعليل:	الأرنب B1 الذي زرعت له قطعة جلدية لأرنب من السلالة A رفض الطعم بعد مرور 12 يوم نتيجة لاكتسابه مناعة. انتقلت هذه المناعة عن طريق اللمفاويات إلى الأرنب B2 مما أدى إلى رفض الطعم بعد 4 أيام فقط و لم تنتقل عن طريق المصل إلى الأرنب B3 حيث رفض الطعم بعد 12 يوم كاملة و هذا نتيجة اكتسابه مناعة خاصة به.
		التعليل:	الأرنب B2 رفض الطعم A بشكل سريع مقارنة بالأرنب B1.
		التعليل:	رفض الفأر B4 للطعم A2 بعد 12 يوم (بشكل بطيء) رغم حقنه بلمفاويات الفأر المحصن B1.
	0.5	ذات ذاكرة	خصائص الاستجابة
	0.5	نوعية	المناعية المتدخلة في رفض الطعم

1. تفسير النتائج المحصل عليها في كل وسط:

- الوسط 1 : شاهد
 - الوسط 2 : تحرير كمية ضعيفة من ^{51}Cr في الوسط مماثلة للشاهد ، فالخلايا T8 و T4 لوحديهما غير كافيتين لتدمير خلايا الطعم.
 - الوسط 3 : تحرير كمية كبيرة من ^{51}Cr (280UA) يفسر بتدمير مهم لخلايا الطعم ، اذن وجود تعاون خلوي بين T8 و T4 و البلعميات لتدمير خلايا الطعم .
 - الوسط 4 : تحرير كمية ضعيفة من ^{51}Cr في الوسط مماثلة للشاهد بعد كبح دور CMH ، يفسر بغياب عرض ببتيديات الطعم (اللاذات) للمفاويات T4 من طرف البلعميات الكبيرة ، ينجم عنه عدم تنشيط T8 وعدم تحفيزها على التمايز الى LTC ، وهذا ما يفسر عدم تدمير خلايا الطعم .
- يتطلب رفض الطعم تعاوناً مناعياً بين المفاويات LT و البالعات الكبيرة

2. رسم تخطيطي وظيفي يوضح الآلية التي سمحت بالحصول على نتيجة الوسط 3 :



- 1 - تثبت الخلية LTC على الخلية المصابة بفضل المستقبل الغشائي TCR المتكامل بنيويا مع المعقد " محدد المستضد - CMH)HLAI" اذن فهي تتعرف تعرفا مزدوجا على HLAI ومحدد المستضد في نفس الوقت.
- 2 - تحتوي الخلية LTC على حويصلات البرفورين، اندماجها مع الغشاء الهولي يؤدي إلى تحرير البرفورين الذي يخترق طبقتي الفوسفوليبيد للغشاء الهولي للخلية المصابة (المستهدفة) .
- 3 - يشكل البرفورين قنوات في غشاء الخلية المصابة.
- 4 - تسمح قنوات البرفورين بدخول الماء والشوارد ما يؤدي إلى انفجار الخلية المصابة و تخریبها.

3. توضيح كيف يؤدي علاج المتلقي بمادة السكلوسبورين إلى مساعدة جسمه على قبول الطعم :

- المعالجة ب cyclosporine يؤدي إلى عدم تركيب IL2 من طرف LT4 ومستقبلاتها من طرف T8 و T4 يؤدي إلى عدم تنشيط المفاويات LT4 وبالتالي عدم تنشيط T8 فلا تمايز إلى LTC مما يؤدي إلى عدم تدمير خلايا الطعم ، فيتم قبول الطعم .

التمرين الثالث : الجزء الأول :

1. تحديد أنواع المشبك و المواد المؤثرة فيها مع التعليل:

المشبك	نوعه	المادة المؤثرة فيه	التعليل
م 1	تنبيهي	السيروتونين	في التجربة 3 عند حقن السيروتونين تم تسجيل كمون عمل في R1 و PPSI في R2 و كمون راحة في بقية الأجهزة.
م 2	تشبيطي	الإنكيفالين	في التجربة 1 عند حقن الإنكيفالين تم تسجيل PPSI في R2 و كمون راحة في بقية الأجهزة.
م 3	تنبيهي	المادة P	في التجربة 2 عند حقن المادة P تم تسجيل PPSE في R4 و كمون راحة في بقية الأجهزة.

2. تفسير نتائج التجربة 4 و 5 :

- التجربة 4:** عند تنبيه العصبون D و وصول الرسالة العصبية الناشئة إلى نهايته يحرر المادة P في الشق المشبكي م 3 و التي عند تثبتها على مستقبلات غشائية قنوية نوعية المتواجدة على مستوى الغشاء بعد مشبكي للعصبون L ، تؤدي إلى انفتاح قنواتها الكيميائية و تدفق داخلي للـ Na^+ عبرها مما يسمح بسجل PPSE بسعة كافية لتوليد كمون عمل في العصبون L وانتشاره نحو الدماغ أين يتم ترجمته إلى إحساس بالألم.
- التجربة 5:** يؤدي تنبيه العصبون S إلى توليد كمون عمل ينتشر على طول هذا العصبون حتى يصل إلى النهاية العصبية فيؤدي إلى تحرير مادة السيروتونين في الفراغ المشبكي م 1 .

		ترتبط مادة السيروتونين بمستقبلات غشائية نوعية موجودة على مستوى الجسم الخلوي للعصبون I مولدة على مستواه كمون عمل ينتشر على طول هذا العصبون فيسجله الجهاز R1 . وصول كمون العمل إلى نهاية العصبون I يؤدي إلى تحرير مادة الانكيفالين في الفراغ المشبكي م2 التي تثبت على مستقبلات غشائية نوعية موجودة على غشاء العصبون D محدثة فرطاً في استقطابه . من جهة أخرى يؤدي تنبيه العصبون D إلى توليد كمون عمل ينتشر على طول هذا العصبون ليصل إلى النهاية العصبية بالتزامن مع حدوث فرط الاستقطاب على مستواها . يتم دمج العصبون D بين الكمونين عن طريق تجميعها فضائياً فنتج PPSE دون عتبة توليد كمون عمل فيبقى العصبون D في حالة راحة وبالتالي لاتصل الرسالة للدماغ و لا يتم الإحساس بالألم .
1	0.5 × 2	3. اقتراح فرضيتين : الفرضية 1: يؤثر الكوديين CODEINE على مستوى المشبك م1 حيث له نفس تأثير السيروتونين (تنبيه العصبون I المفرز للإنكيفالين) وذلك بالتثبت على مستقبلاته النوعية. الفرضية 2: يؤثر الكوديين CODEINE على مستوى المشبك م2 حيث له نفس تأثير الإنكيفالين (تثبيط العصبون D المفرز للمادة P) وذلك بالتثبت على مستقبلاته النوعية.
1.5	0.25 0.5 0.75	<u>الجزء الثاني:</u> - المصادقة على صحة الفرضيتين: استغلال الوثيقة 2 : من الشكل أ : للكوديين و الإنكيفالين مجموعات كيميائية متماثلة مما يسمح له بالتثبت على المستقبلات النوعية للإنكيفالين و المتواجدة في المشبك م2. من الشكل ب : يؤدي تثبت الإنكيفالين على مستقبلاته الغشائية المتواجدة على مستوى غشاء المحور الأسطوانى للعصبون D إلى تقليل تواتر كمونات العمل الواردة إلى نهاية هذا العصبون مما يؤدي إلى تناقص في كمية المادة P المحررة مما يسمح بفتح عدد أقل من القنوات الكيميائية بعد مشبكية و بالتالي تدفق Na+ بكميات أقل فينتج PPSE بسعة دون عتبة توليد كمون عمل. المصادقة : للكوديين و الإنكيفالين مجموعات كيميائية متماثلة مما يسمح للكوديين بالتثبت على المستقبلات النوعية للإنكيفالين و المتواجدة على مستوى غشاء المحور الأسطوانى للعصبون D و التقليل من تواتر كمونات العمل الواردة إلى نهاية هذا العصبون مما يؤدي إلى تناقص في كمية المادة P المحررة مما يسمح بفتح عدد أقل من القنوات الكيميائية بعد مشبكية و بالتالي تدفق Na+ بكميات أقل فينتج PPSE بسعة دون عتبة توليد كمون عمل و وبالتالي عدم تسجيل كمون عمل و انتشاره نحو الدماغ و منه عدم الإحساس بالألم. إذن الفرضية المحققة هي الفرضية 2.
1	1	<u>الجزء الثالث : الرسم التخطيطي الوظيفي</u>