


على التلميذ أن يعالج أحد الموضوعين على الخيار

الموضوع الأول موحد بين الثانويات "بومروان، رفراف أحمد، رجم عبد الله، سيدي ابراهيم"

من الصفحة 1 إلى الصفحة 4

التمرين الأول: (5 نقاط) اللقاح ضد الدفتيريا يتطلب تلقي الشخص المراد تلقيحه سم الدفتيريا المعالج بالحرارة والפורمول فقد سميته لكن احتفظ بقدرته على توليد الاستجابة المناعية، وهو ما يعرف باللاس "Anatoxine" كما يمكن اكتساب مناعة ضد سم الدفتيريا عن طريق الاستمصال أي نقل مصل من شخص محصن ضد نفس المستضد، الوثيقة التالية تمثل بعض التجارب المجرى على حيوانات الكوبي.



1. اعتمادا على الوثيقة ومكتسباتك اختر الإجابة الأكثر وجاهة من بين المقترحات:

ج. الرشاحة المحقونة للحيوان 2 تحتوي على :

أ. المصل المأخوذ من الحيوان يحتوي على :

A. أجسام مضادة ضد الدفتيريا

A. أجسام مضادة ضد سم الدفتيريا.

B. مسحوق عاطل وأجسام مضادة ضد الدفتيريا

B. اللمفاويات السامة.

C. عدم احتوائها على المسحوق العاطل ولا على

C. أجسام مضادة ضد سم الدفتيريا ولفاويات سامة.

الأجسام المضادة ضد الدفتيريا.

ب. خاصية النوعية للأجسام المضادة تظهرها التجارب المجرى على :

د. الحيوان رقم 3 بقي حي بسبب :

A. الحيوان 1

A. حقنه بسم الدفتيريا

B. الحيوان 2

B. وجود أجسام مضادة لسم الدفتيريا في الرشاحة

C. الحيوانين 2 و 4


C. وجود جزيئات المسحوق العاطل في الرشاحة.

2. اشرح في نص علمي منظم ومهيكل أهمية كل من الاستمصال والتلقيح في حماية العضوية من العناصر الغريبة مبرزا دور البروتينات في ذلك.


الصرع عبارة عن نوبات عصبية تنتج عن اضطراب في الإشارات الكهربائية في خلايا المخ وتتميز بحدوثها المتكرر عند الأشخاص الكبار والصغار. لفهم أسباب هذا المرض عند الأطفال وتأثير الأدوية في التخفيف من هذه النوبات العصبية نقترح عليك الدراسة التالية.

الجزء الأول: من خلال الدراسات الطبية الحديثة وجد أن هناك بعض المواد والجزئيات الخلوية لها علاقة بنوبات الصرع.

الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة "1" توضح أثر مادة الغلوتامات **Glutamat**.



1. حدد تأثير مادة الغلوتامات على نوبات الصرع انطلاقاً من استغلالك للشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة 1.



الجزء الثاني: الدراسة التالية توضح العلاقة

الموجودة بين مستقبلات الـ **NMDA** والبعد مشيكية والتسجيلات الكهربائية عند طفل سليم وآخر مصاب، جدول الوثيقة "2" يعبر عن النتائج المحصل عليها. الرسم التخطيطي للوثيقة "2" يوضح تأثير دواء الـ **BZD**.

Benzodiazépine

1. باستغلال معطيات الوثيقة "2" بين

سبب حدوث نوبات الصرع وتأثير

دواء الـ **BZD** في التخفيف من

نوبات الصرع.

2. وضع في مخطط وظيفي كيفية

حدوث نوبات الصرع وكيفية تأثير


دواء **BZD** في التخفيف من

نوبات الصرع عند الأطفال.

التمرين الثالث: (8)

تستهدف بعض المضادات الحيوية انزيمات البكتيريا محدثة توقف نموها، غير أنه تطرأ تغييرات على البكتيريا بمرور الزمن كرد فعل مقاوم لهذه المضادات، فتصبح أقل استجابة للأدوية مما يصعب علاج الالتهابات ويزيد خطورة انتشار الأم ارض والاعتلالات الوخيمة، وقد توصل العلماء أن ذلك يحدث في مراحل متتالية. نريد معرفة آلية حدوث ذلك فنقترح ما يلي:

الجزء الأول: تم تحديد العلاقة بين انزيم ARN بوليميراز لبكتيريا *Bacillus anthracis* والريفاميسين وذلك بقياس نشاط الإنزيم في وجود وغياب الريفاميسين (الشكل 1) ، في حين اعطت المتابعة الجزئية لأعداد الانزيمات ARNp المرتبطة لتشكيل معقدا جزئي في الأصناف الثلاثة للبكتيريا في وجود الريفاميسين النتائج المثلة في الشكل 2 للوثيقة 1.



باستغلالك لنتائج الوثيقة 1.

1. حدد البكتيريا الحساسة والمقاومة للمضاد الحيوي ثم استخرج المشكلة العلمية التي تطرحها النتائج بخصوص الريفاميسين.


2. اقترح فرضية تفسر بها العلاقة بين الأصناف الثلاثة من البكتيريا والمضاد الحيوي.

الجزء الثاني: في دراسة مكلمة للدراسة السابقة وبغرض الإجابة على المشكلة وتأكيد صحة الفرضية السابقة نقدم معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ): يمثل نماذج جزيئية باستعمال مبرمج Rastop للـ ARNp بوليميراز في وجود الركيزة والريفاميسين.

- الشكل (ب): نتائج مقارنة تتالي أجزاء من السلسلة الببتيدية المشكلة للـ ARNp بوليميراز لدى الأصناف الثلاثة من البكتيريا

- الشكل (ج): يمثل بنية جزء من انزيم ARNp بوليميراز يشمل الموقع الفعال لدى بكتيريا الصنف 1



باستغلالك للنتائج الوثيقة (2):

1. قدم إجابة للمشكل المطروح في الجزء الأول. ثم صادق على الفرضية المطروحة


2. اقترح حلا مبنيا على أسس علمية لتجاوز هذه العقبة.

الجزء الثالث: انطلاقا مما توصلت إليه ومعارفك حول الموضوع، في فقرة اشرح أهمية استعمال المضادات الحيوية مبرزا انعكاسات كثرة استعمالها على العضوية.

الموضوع الثاني: من الصفحة 4 إلى الصفحة 6

التمرين الأول: 05 نقاط

تعتمد حياتنا بشكل كامل على الوظائف الحيوية المنسقة التي تؤديها البروتينات الوظيفية، و تعتمد وظيفية البروتين و بنيته على خصائص وحداته البنائية، تقدم الوثيقة أسفله تفاصيل بسيطة حول هذه العلاقات.




1- باستغلالك للوثيقة -1- اذكر مميزات كل بنية.

2- بتوظيف ما سبق و معلوماتك المكتسبة بين في نص علمي أن التخصص الوظيفي لهذا الإنزيم يبدأ من البنية (أ).

التمرين الثاني: 7 نقاط

يتوقف حياة الخلية على حدوث تفاعلات اضية متعددة، تحفزها انزيمات تشرف على تركيبها مورثات.


يسمح تركيب انزيم β . جلاكتوزيداز (β .Galactosidase) عند خلايا بكتيريا *Escherichia coli* (E.coli) من استعمال سكر اللاكتوز كمصدر اضي لنموها.



الجزء الاول: لتحديد العلاقة بين تواجد الإنزيم و النشاط الاضي (استعمال اللاكتوز) في الخلية البكتيرية.

اجريت الدراسة الآتية: وضعت بكتيريا *E. coli* في وسطين زرع (1) و (2)، احدهما يحتوي على اللاكتوز و الآخر يحتوي على الجلوكوز.

• نتائج تطور عدد البكتيريا و قياس كمية انزيم β . جلاكتوزيداز في الوسطين (1) و (2) و كمية الجلوكوز في الوسط (2) فقط، مثلة في الوثيقة (1).



- باستغلال الوثيقة (1):


1- حدد العلاقة بين انزيم β . جلاكتوزيداز و

تطور نمو البكتيريا *E. coli*.

2- بين تأثير سكر اللاكتوز و الجلوكوز على

تطور كمية انزيم β . جلاكتوزيداز.

الجزء الثاني : لفهم آلية تأثير سكر اللاكتوز على تركيب إنزيم β -جلالكتوزيداز نقترح معطيات الوثيقة (2) حيث: الشكل (أ): يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج اليوردين المشع داخل خلايا البكتيريا *E. coli* و تكاثرها في شروط تجريبية متغيرة (اللاكتوز, الجلوكتوز). الشكل (ب): يمثل رسم تخطيطي لآلية كبح مورثة انزيم β -جلالكتوزيداز في حالة غياب اللاكتوز في الوسط .



باستغلال الوثيقة (2) و معلوماتك :

- 1- وضح كيف يتم التحكم في النشاط الايضي المدروس عند الخلايا بكتيريا *E. coli* في حالة غياب اللاكتوز .
- 2- مستعينا بمعطيات و رموز الشكل (ب) انجز رسم تخطيطي لآلية تنظيم تفاعل اماهة اللاكتوز و علاقته بنمو البكتيريا في حالة وجود اللاكتوز .

التمرين الثالث : 8 نقاط

للجهاز المناعي دور كبير في اقضاء اللاذات و ذلك بفضل مختلف الخلايا المناعية المكونة له و الجزيئات البروتينية المتدخلة في الاستجابة المناعية . يعاني بعض الاطفال الصغار من قصور مناعي خطيرو نادر (يصيب حوالي طفل واحد من 100 الف) تتمثل اعراضه في التهاب رئوي حاد - امراض تعفنمية تنفسية - اسهالات حادة من اصل تعفني - تقرحات معدية - التهاب السحايا الخ . هذه الاعراض تسببها بكتيريا مختلفة مثل : العقديية *Streptococcus*, المستديمة *Haemophilus* و كذلك الفيروسات . الطفيليات و الفطريات , يعرف هذا المرض بمتلازمة بروتون (Syndrome de Bruton) و هو مرض نادر يصيب في معظم الاحيان الذكور . لفهم سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية :


الجزء الأول : الوثيقة 1 بها ثلاثة أشكال أ، ب , ج حيث :

الشكل -أ- : يمثل نتائج تحاليل طبية أنجزت للطفل أيمن بعد وضعه 18 شهر في المستشفى حيث تلقى مجموعة من اللقاحات (الكزاز , الدفتيريا , الحصبة) لمعرفة سبب الالتهابات البكتيرية التي كانت دافعا لإدخاله إلى المستشفى .

الشكل -ب- : نتائج الهجرة الكهربائية لمصل ثلاث أطفال حيث :

الطفل a: مصاب بالالتهاب البكتيري الطفل b: غير مصاب بالالتهاب البكتيري (سليم) الطفل c: ايمن مصاب بالالتهاب البكتيري

الشكل -ج- : يبين الخلايا LB الناضجة في الأعضاء المحيطة اثر تماسها بالمستضد تتمايز إلى خلية منتجة للأجسام المضادة عند شخص سليم .



- 1- باستغلالك للوثيقة (1) اقترح فرضيتين تفسر فيهما سبب مرض الطفل ايمن او ما يعرف بمتلازمة بروتون .

الجزء الثاني: للتأكد من صحة الفرضيات المقترحة تم إنجاز الدراسة التالية :

- تم قياس نسبة اللمفاويات عند إيمان فكانت النتائج الموضحة في الجدول 2-أ.

عند إيمان (18 شهر)	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر	
$3.5 \cdot 10^7$	من $2.5 - 10^7$	مجموع اللمفاويات
أقل من $10^7 \cdot 0.03$	من $0.1 - 10^7 \cdot 0.4$	اللمفاويات B
$3.2 \cdot 10^7$	من $1.5 - 10^7 \cdot 3.0$	اللمفاويات T
تركيز الأجسام المضادة عند إيمان	القيم الطبيعية عند أطفال في سن 18 شهر	الأجسام المضادة
0.17 غ/ل	10.5.5 غ/ل	
الوثيقة 2-أ		

- كما تظهر الوثيقة 2-ب تتابع

نكليوتيدي لجزء من مورثة XLA

المسؤولة عن تركيب انزيم تيروزين -

كيناز و كذلك السلاسل الببتيدية

التي تدخل في تركيب الانزيم عند

الطفل العادي و عند إيمان .



- بينما الوثيقة 2-ج فتوضح

بعض مراحل نضج الخلية

LB على مستوى العضو المركزي

(نقي العظام) انطلاقا من الخلية

الجذعية الام في الظروف العادية .



1- اشرح سبب متلازمة البروتون التي يعاني منها إيمان بإيجاد علاقة منطقية بين معطيات الوثيقة 2 مع التحقق من صحة إحدى الفرضيات .

الجزء الثالث: انطلاقا من معارفك و هذه الدراسة أنجز مخطط لمختلف الظواهر التي تحدث للخلية LB و في وجود المستضد و ذلك على مستوى أعضاء الجهاز المناعي .

انتهى الموضوع الثاني

أساتذة المادة

نتمنى لكم التوفيق والنجاح

الاجابة النموذجية مع سلم التنقيط للموضوع الأول

العلامة	الاجابة النموذجية			رقم السؤال
0.25 X4		السؤال	الإجابة الأكثر وجاهة	التمرين الأول <u>1</u>
		أ	A	
		ب	C	
		ت	C	
		ث	B	
المنهجية 0.5	2. النص العلمي:			<u>2</u>
0.25	البروتينات جزيئات متخصصة وظيفيا تلعب دورا هاما في حماية العضوية من العناصر الغريبة، ولمواجهة العوامل المرضية تم استحداث طرق فعالة مثل اللقاح والاستمصال التي تعتمد أساسا على آليات الرد المناعي الخلطي.			
0.25	<u>فيما تكمن أهمية كل من الاستمصال والتلقيح في حماية العضوية من العناصر الغريبة؟ وما دور البروتينات في ذلك؟</u>			
0.25	عند دخول جسم غريب للعضوية ينتقي لمة من اللمفاويات البائية نتيجة التكامل البنيوي بين مستقبلها			
0.25	الغشائي <u>BCR</u> ومحدد المستضد، ينتج عن الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية إنتاج عناصر دفاعية من طبيعة			
0.25	بروتينية من نوع غاما غلوبولين تدعى الأجسام المضادة التي تنتقل في المصل، فيتم نقل المصل المحصن والحاوي على			
0.25	الأجسام المضادة النوعية إلى شخص آخر وهو ما يعرف بالاستمصال حيث تمتلك الأجسام المضادة موقعين :			
0.25	<u>موقع تثبيت محدد المستضد على مستوى المنطقة المتغيرة يتم تثبيت محدد المستضد نتيجة التكامل البنيوي</u>			
0.25	بينهما فيشكل معه معقدات مناعية (جسم مضاد - مستضد) فيمنع انتشاره وتكاثره ويبطل مفعوله، كما يمتلك <u>موقع</u>			
0.25	<u>التثبيت على المستقبلات الغشائية للماكروفاج مما يسمح بتثبيت المعقدات المناعية على المستقبلات الغشائية النوعية</u>			
	للماكروفاج لسهيل بلعمتها والقضاء على المستضدات بشكل سريع وفعال.			
0.25	أما <u>التلقيح هو حقن جسم غريب فقد سميته واحتفظ بخصائصه كمولد ضد</u> قادر على توليد استجابة مناعية نوعية			
0.25	خلطية فيتم إنتاج أجسام مضادة نوعية ضد نفس المستضد وهو ما يعرف بالتلقيح وفي نفس الوقت تتشكل خلايا ذات			
0.25	الذاكرة <u>LBm</u> قادرة على تنفيذ استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية في حالة دخول المستضد حيث تعمل			
0.25	الأجسام المضادة على الارتباط نوعيه به وتسهيل بلعته والقضاء عليه.			
	اقضاء المستضدات يتطلب تدخل بروتينات متخصصة وظيفيا ولحماية العضوية يمكن اللجوء إلى الاستمصال أو			
0.25	التلقيح اللتان تعتبران فعالتان للقضاء على المستضدات.			
0.5	1(تحديد تأثير مادة الغلوتامات على نوبات الصرع:			التمرين الثاني <u>الجزء الأول</u>
	-الشكل (أ) يوضح بنية نهاية عصبية مشبكية حيث تظهر مستقبلات مادة الغلوتامات على مستوى الغشاء بعد مشبكي المتمثلة في AMPA , NMDA و تتحرر جزيئات الغلوتامات من نهاية الخلية قبل مشبكية نحو الشق المشبكي.			
0.5	-الشكل (ب) يوضح بنية المستقبل NMDA على مستوى الغشاء بعد مشبكي ويتميز هذا المستقبل البروتيني بوجود موقع			
	لإرتباط الغلوتامات من جهة و موقع لإرتباط الغلايسين أو D - سيرين.			
0.5	-تثبت مادة الغلوتامات على موقع الخاص بها للمستقبل NMDA () يؤدي الى انفتاح قنوات بشكل مستمر تسمح بمرور شوارد			
0.5	موجبة المتعلقة بزوال استقطاب النهاية العصبية.			
	ومنه لمادة الغلوتامات Glutamate أثر تحفيزي على الخلايا العصبية و توليد سيالات عصبية مستمرة لفترة زمنية.			
	<u>الجزء الثاني</u>			
0.75	من خلال الجدول نلاحظ أن عدد مستقبلات NMDA(عند الطفل السليم قليلة مما يسبب تولد عدد قليل من كمونات العمل التي تنتج سيالات عصبية قليلة مقارنة بما يلاحظ عند طفل مصاب بالصرع، وجود عدد أكبر من			<u>الجزء الثاني</u>

0.75	المستقبلات يؤدي لتولد كمونات عمل متزايدة أي سيالات عصبية كثيرة فاضطرابات وأعراض نوبات الصرع.	
0.75	من خلال الرسم التخطيطي الذي يمثل نهاية عصبية مشبكية توضح العلاقة الوظيفية بين جزيئات الـ GABA وجزيئات دواء الـ BZD ، فإن ارتباط جزيئات الـ GABA على مستقبلاتها الغشائية للغشاء بعد مشبكي يؤدي الى فتح قنوات فولطية متخصصة في نفاذية شوارد الـ Cl ⁻ في اتجاه تدرج التركيز مما يسبب فرطاً في الاستقطاب مؤدياً الى كمونات عمل تثبيطية PPSI توازن عمل مادة الغلوتامات في توليد كمونات عمل تنبيهية PPSE	
0.75	تدخل جزيئات الـ BZD كعامل مساعد لنشاط مادة الـ GABA بحيث تثبت على مستقبلاتها الغشائية مسببة في استمرار نفاذية شوارد الـ Cl ⁻ وبالتالي اطالة الأثر التثبيطي للـ GABA والتقليل من السيالات العصبية التي تسبب الاضطرابات العصبية و نوبات الصرع.	
0.75	ومنه فإن دواء الـ BZD يمثل عاملاً مساعداً لنشاط مادة الـ GABA في التقليل من نوبات الصرع عند الأطفال	
2	انجاز مخطط وظيفي: ملاحظة: تقبل مخططات أخرى التي تصب في نفس المضمون. مخطط وظيفي يوضح كيفية حدوث نوبات الصرع وكيفية تأثير دواء BZD في التخفيف من نوبات الصرع عند الأطفال.	2
0.25	استغلال أشكال الوثيقة 1:	التمرين الثالث
0.25	استغلال الشكل 1: يمثل الشكل تغيرات النشاط الانزيمي لإنزيم ARN بوليميراز بدلالة الزمن لدى 3 أصناف من البكتيريا حيث نلاحظ أنه قبل إضافة المضاد الحيوي للوسط يكون نشاط أنزيم ARN بوليميراز أعظمي عند الأصناف الثلاثة،	
0.25	وبعد إضافة المضاد الحيوي اختلف نشاط الانزيم في الأصناف البكتيرية الثلاثة حيث تناقص نشاطه بشكل ملحوظ في بكتيريا الصنف 3 حتى انعدم في الزمن 0.5 يوم وتناقص بشكل تدريجي عند الصنف 2 حتى بلغ قيمة 50% في الزمن 0.8 يوم، ولم يتأثر نشاطه في بكتيريا الصنف 1 .	
0.25	مما يدل على أن المضاد الحيوي أثر سلباً على نشاط أنزيم ARN بوليميراز بشكل كبير على الصنف 3 وبشكل ضئيل على الصنف 2 ولا تؤثر على الصنف 3.	
0.5	استغلال الشكل 2: يمثل الشكل تغيرات أعداد ARNp المرتبط في الأصناف الثلاثة للبكتيريا حيث نلاحظ أن ARNp يكون أكثر ارتباطاً في بكتيريا الصنف 3 ويقدر بحوالي 1 (و.1) وعدد ARNp المرتبطة مع الصنف 2 يقدر بحوالي (0.5 و) أما عند الصنف 1 يكون عدد ARNp المرتبطة مع المضاد الحيوي ضئيلة جداً أقل من (0.2 و)	

0.25	اعتبارية). مما يدل على أن ARNp الصنف 3 أكثر مع المضاد الحيوي مقارنة بالصنفين 1 و 2.
0.5	ومنه السلالة المقاومة للمضاد الحيوي هي الصنف 1 والسلالتين الحساسيتين هما الصنف 3 والصنف 2 الأقل حساسية.
0.5	استخراج المشكلة العلمية: ما سبب مقاومة الصنف 1 للمضاد الحيوي؟ وعدم مقاومة الصنفين 1 و 2 له؟
0.25	2. اقتراح الفرضية: بما أن بكتيريا الصنف 1 هي المقاومة للمضاد الحيوي وبما أن عدد ARNp المرتبطة بالمضاد الحيوي عند هذا الصنف كان ضئيل جدا وبما أن بكتيريا الصنف 2 و 3 هي الحساسة للمضاد الحيوي وبما أن عدد ARNp المرتبطة بالمضاد الحيوي عند هذين الصنفين كبير وعليه:
0.25	<u>الفرضية</u> : يعود سبب مقاومة بكتيريا الصنف 1 بالمضاد الحيوي راجع لمنع ارتباط المضاد بانزيم ARNp بسبب وجود طفرات في المورثة المشفرة على تركيبه.
0.25	و يعود سبب حساسية بكتيريا الصنف 2 و 3 للمضاد الحيوي راجع لارتباط المضاد بانزيم ARNp نتيجة التكامل البنيوي بينهما وتثبيط نشاطه.
0.25	<u>ملاحظة</u> : تقبل كل فرضية أخرى بشرط أن تكون وجيهة
	الجزء الثاني: استغلال نتائج الوثيقة 2 :
0.25	استغلال الشكل "أ" يظهر الشكل أن الريفاميسين يرتبط بانزيم ARNp في مستوى الموقع الفعال مكان ارتباط .
0.25	ADN مما يدل على وجود تكامل بنيوي بينهما.
0.5	استغلال الشكل "ب": يمثل الشكل عرضا باستعمال برنامج Anagene لبروتين انزيمي هو ARNp لدى 3 أصناف بكتيرية حيث نلاحظ أن الأصناف الثلاثة تختلف عن بعضها في بعض الأحماض الأمينية في المواقع 43,60,89,99,129,201 مما يدل على اختلاف البنية الفراغية للموقع الفعال للأنزيم لدى الأصناف الثلاثة.
0.25	استغلال الشكل (ج): نلاحظ من خلال الشكل أن الموقع الفعال للأنزيم ARNp لدى بكتيريا الصنف 1 يتكون من أربعة أحماض أمينية هي Ser89, Phe99, Asp129, Tyr201
0.25	<u>مما يدل</u> على أن البنية الفراغية للموقع الفعال للأنزيم محددة بعدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية.
0.5	<u>وعليه</u> فإن الريفاميسين يرتبط بالموقع الفعال للأنزيم ARNp مكان ارتباط ADN نتيجة التكامل البنيوي بينهما كمشط تنافسي عند البكتيرية من الصنف 3 ما يعرقل عمل هذا الأنزيم المتمثل في اجراء الاستنساخ فتتوقف بذلك عملية الترجمة ومنه توقف تكاثر الخلايا (التقليل من عددها)
0.75	أما عند الصنف 2 ونتيجة تغير في الحمضين الأمينيين Glu43, Asn60 القريبان من الموقع الفعال للأنزيم واللذان يساهمان في ثبات واستقرار البنية الفراغية للموقع الفعال مما يعرقل التكامل البنيوي التام بين الريفاميسين والموقع الفعال للأنزيم ويستمر نشاط الأنزيم في استنساخ ADN وتركيب البروتين لكن بنسبة أقل فيكون الصنف 2 أقل مقاومة للمضاد الحيوي ، أما عند الصنف 1 الطفرات أدت لتغير النمط الجزيئي لبروتين ARNp في مستوى الموقع الفعال بتغيير الأحماض 89 Ala بالحامض Ser و الحمض 99 His بالحامض Phe وكذا الحمض 129 Pro بالحامض Asp بالإضافة لاستبدال الحمض 201 Ile بالحامض Tyr وكلها في مستوى الموقع الفعال ما أدى لفقد قدرة تثبيت المضاد الحيوي واستمرار استنساخ ADN فتستمر عملية تركيب البروتين بشكل طبيعي فتتكاثر الخلايا البكتيرية وتغلت من الماد الحيوي. وهو ما يجيب على المشكل العلمي الطروح سابقا ويؤكد صحة الفرضية المطروحة سابقا.
0.5	-اقتراح حل لتجاوز هذه العقبة: استعمال مضاد حيوي مختلف يمكنه التثبيت على الموقع الفعال للأنزيم ARN بوليميراز وتثبيط نشاطه مما يسمح بالقضاء على البكتيريا ومنع تطورها .
1	الجزء الثالث: بمجرد اكتشاف الانسان لأليات تركيب البروتين في الخلايا حاول تطبيق هذا الاكتشاف في معالجة بعض الإصابات المرضية الناتجة عن العدوى البكتيرية حيث تمكن الانسان من تطوير علاجات فعالة تدعى المضادات الحيوية التي تعمل على منع تكاثر الخلايا البكتيرية وبالتالي إيقاف العدوى عن طريق وقف عملية هامة هي تركيب البروتين، حيث يمكن أن توقف عملية الاستنساخ بالارتباط مع انزيم ARNp مثل الريفاميسين كما يمكن لمضادات أخرى أن توقف تركيب البروتين في مستوى الترجمة أو تنشيط الحمض الأميني . غير أن استعمال هذه المضادات كما أنه يمكن ان يوقف العدوى البكتيرية فإنه يمكن أن يكون سبب في تطور أصناف بكتيرية أخرى في حالة عدم استعمالها بعقلانية وتحت اشراف طبي.

تصحيح الموضوع الثاني

العلامة الكاملة	العلامة المجزأة	الجواب	رقم الجواب
2.5	0.75	1- التعرف على البنيتين ا و ب مع ذكر مميزات كل بنية : البنية البنية ا: بنية اولية البنية ب: بنية ثالثة	التمرين الاول 5 ن
	0.25 0.5 1	المميزات - تتميز بوجود نوع واحد من الروابط الببتيدية بين الاحماض الامينية , و عدم وجود اي انطواء للسلسلة الببتيدية . - تتميز بالشكل الفراغي ثلاثي الابعاد الذي تاخذه السلسلة الببتيدية . - تتميز بالتفاف لعدد من البنيات الثانوية لسلسلة ببتيدية واحدة تفصلها مناطق انعطاف . - تحافظ على استقرارها بواسطة 4 انواع من الروابط : كبريتية , شاردية , هيدروجينية و كارهة للماء بين المجموعات الكيميائية الموجودة في السلاسل الجانبية .	
2.5	0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5	النص العلمي : مقدمة: تحتوي الخلايا الحية على عديد الانواع من البروتينات لكل منها بنيتها و وظيفتها المميزة لها , كما ان لتسلسل الاحماض الامينية دور كبير في تحديد شكل و وظيفة البروتين . المشكلة : كيف تسمح البنية الاولى للبروتين الانزيمي في تحديد تخصصه الوظيفي ؟ التقصي : يعود التخصص الوظيفي للبروتين (انزيم) الى اكتسابه بنية فراغية ثالثة محددة . - المعلومة الوراثية هي اصل تنوع الاحماض الامينية عددها و نوعها و ترتيبها (حيث تكون الاحماض الامينية في البنية الاولى متباعدة) و هذا يساهم في تحديد طريقة انطواء البروتين (ذو البنية الاولى). و بالتالي نوع و عدد الروابط الناشئة بين السلاسل الجانبية (الجذور) للاحماض الامينية المتمثلة في الروابط التكافؤية : الكبريتية و اللاتكافؤية : الهيدروجينية , الشاردية , الكارهة للماء يؤدي هذا الى تشكل بنية فراغية طبيعية للبروتين تكسبه وظيفته الفزيولوجية (حيث تكون الاحماض الامينية للموقع الفعال متقاربة مشكلة بذلك موقع التثبيت الذي يتشكل بين جذور الاحماض الامينية المشكلة له و المجموعات الكيميائية للركيزة روابط انتقالية: شاردية , هيدروجينية نتيجة التكامل البنيوي فيكون الانزيم نوعي تجاه مادة التفاعل). الخاتمة : البنية الفراغية ثالثة الابعاد للبروتين يحددها تسلسل الاحماض الامينية نوعها و عددها في السلسلة الببتيدية وفق المعلومة الوراثية و لكل نوع من انواع البروتينات بنية خاصة و وظيفة البروتين تحدد البنية الفراغية للبروتين .	التمرين الثاني 7 ن
	0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5	الجزء الاول : 1- تحديد العلاقة بين الانزيم و نمو البكتيريا : منحنى الوسط 1: يمثل تغيرات عدد البكتيريا و كمية الانزيم قبل و بعد اضافة الجلوكوز حيث : تزايد عدد البكتيريا بعد اضافة الجلوكوز مباشرة بينما تنعدم كمية الانزيم قبل و بعد اضافة الجلوكوز يدل على نمو البكتيريا في حالة جلوكوز لا يتطلب انتاج انزيم B- جلاكتوزيداز . منحنى الوسط 2: يمثل تغيرات عدد البكتيريا و كمية الانزيم و الجلوكوز قبل و بعد اضافة اللاكتوز قبل اللاكتوز : ثبات عدد البكتيريا في قيمة 10 مليون و انعدام كمية الانزيم و الجلوكوز . بعد اضافة اللاكتوز : يظهر انزيم و تتزايد كميته حتى يصل الى قيمة عظمى 9 (و ا) في $z=1.8$ سا بينما يظهر جلوكوز و تزايد كميته مع تزداد عدد البكتيريا في نفس اللحظة الزمنية حيث كمية الجلوكوز تصل الى 9.5 (و ا) في $z=2.15$ سا مما يدل على ان نمو البكتيريا يتطلب توفر جلوكوز الذي ينتج عن نشاط انزيم B. جلاكتوزيداز و منه العلاقة : - في حالة وجود اللاكتوز فقط : يتوقف نمو البكتيريا على انتاج انزيم B. جلاكتوزيداز - في حالة وجود الجلوكوز فقط : نمو البكتيريا لا يتطلب انتاج انزيم B. جلاكتوزيداز 2- تبيان تاثير اللاكتوز و الجلوكوز : يتبين من المنحنيات للوثيقة 1 انه في حالة اضافة اللاكتوز ينتج عنه تزايد تركيز الانزيم بينما في حالة ظهور الجلوكوز يتناقص تركيز الانزيم و منه : نستنتج ان تاثير سكر اللاكتوز محفز على انتاج الانزيم و الجلوكوز مثبط لانتاج الانزيم	
	0.25	1-التوضيح: استغلال الوثيقة 2 : الشكل ا: يمثل تغيرات نسبة دمج اليوريددين و تكاثر البكتيريا في شروط تجريبية متغيرة (جلوكوز , و	الجزء الثاني

1	0.25 0.5 0.25 0.25 0.75	1- شرح سبب متلازمة بروتون التي يعاني منها الطفل ايمن مع التاكيد من صحة احدى الفرضيات : - تظهر الوثيقة 2 - 1 : نتائج قياس نسبة اللمفويات عند ايمن و عند اطفال غير مصابين بمتلازمة بروتون حيث نلاحظ ان عدد اللمفاويات LB في الوسط في الحالة العادية اي عند الاطفال غير مصابين بمتلازمة بروتون تقدر ب: 0.1- 0.4 . 10 7 و لكن تركيزها في عضوية الطفل المريض (ايمن) قليلة جدا تقدر باقل من 0.1 . 10 7 , بينما اللمفاويات LT فنسبتها متماثلة عند كل الاطفال (المصابين و غير المصابين بمتلازمة بروتون) . كما نلاحظ ان كمية الاجسام المضادة عند ايمن تكون قليلة جدا حيث تقدر بحوالي 0.17 غ /ل اي تقريبا منعدمة , بينما تتراوح عند الاطفال غير المصابين بين 5.5- 10 غ /ل في نفس السن . و منه : الاطفال المصابون بمتلازمة بروتون لا يملكون الخلايا اللمفاوية من النوع LB لكن يملكون الخلايا اللمفاوية LT و عليه هذه النتائج تنفي الفرضية التي تنص على ان هناك خلل في نقي العظام (العضو المركزي)لانه مقر نشاء الخلايا التائية و البائية معا . كما تظهر الوثيقة 2-ب : تتابع نكليوتيدي لجزء من مورثة XLA المسؤولة عن تركيب انزيم تيروزين - كيناز و كذلك السلاسل الببتيدية التي تدخل في تركيب الانزيم عند الطفل العادي و عند ايمن . يظهر ان الانزيم ال XLA العادي يحتوي على PH-TH-SH 3-SH2-KINASE DOMAINE بينما XLA ايمن يحتوي فقط على PH-TH و جزء صغير جدا من SH 3 , يعود الى حدوث حذف نكليوتيدتين الاولى تقع في الرامزة 214 و الثانية تقع في الرامزة 215 و هما على التوالي T و G و هذا ما ادى الى تغير في تتابع الاحماض الامينية من جهة و كذلك الحصول على رامزة توقف في الموقع 223, فنتج عنه بروتين غير فعال =غير وظيفي . من الوثيقة 2-ج : تظهر ان الخلايا الانشائية لا تملك مؤشرات ال BCR فتتحول الى خلايا LB غير ناضجة و هذا بتركيب مؤشر غشائي غير كامل , و منه تتحول الى خلايا ناضجة بتدخل انزيم تيروزين -كيناز XLA . بذلك : متلازمة بروتون ناتجة عن امتلاك الاطفال انزيم XLA غير وظيفي يعود لخلل وراثي و هذا الانزيم هو المسؤول عن نضج الخلايا LB ومنه غياب الخلايا LB المؤهلة مناعيا المسؤولة عن التصدي للمستضدات في الاعضاء المحيطية و هذا ما يؤكد الفرضية التي تنص على : - غياب الخلايا LB الناضجة في الاعضاء المحيطية , او عجز الجهاز المناعي على تركيب خلايا LB ناضجة و تنفي الفرضية التي تنص على ان عضوية ايمن لا تحتوي على الخلايا المنفذة (LBP) .	الجزء الثاني
1.25		مخطط لمختلف الظواهر التي تحدث للخلية LB في وجود المستضد و ذلك على مستوى اعضاء الجهاز المناعي <pre> graph TD subgraph "عضو محيطي الطحال مثلا" A[انتقاء البائية من طرف المستضد تكمال بين محدث المستضد و BCR] --> B[تكاثر البائية المنققة مشكلة لمة لها نفس BCR] B --> C[خلايا بائية ذاكرة تدخل عند LBm عودة نفس المستضد] B --> D[تميل الى بلازمية LBp تنتج اجسام مضادة توعية] end subgraph "عضو مركزي نقي العظام" E[خلية بائية انشائية ناضجة - بدون BCR -] --> F[تركيب مستقل براسطة انزيم XLA غشائي BCR] F --> G[خلية بائية ناضجة مؤهلة مناعيا] end G --> A </pre>	الجزء الثالث