

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولاية البليدة

امتحان بكالوريا تجريبي التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

ثانوية: هني رابح خزرونة.

دورة: ماي 2023



المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (5) صفحة (من الصفحة 1 من 10 الى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (5 نقاط)

تعتبر النباتات الخضراء مقرا لظاهرة حيوية تسج بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وفق سلسلة من تفاعلات حيوية هامة منظمة في مراحل حيث أن استمرار هذه الظاهرة متعلق أساسا بنواتج المراحل والتي تعتبر متطلبات لحدوث المرحلة الموالية، الا أن بعض المركبات مثل **Paraquat** يعمل على توقيف أحد هذه التفاعلات. تمثل الوثيقة التالية إحدى هذه المراحل.



- 1- تعرف على البيانات المرقمة (من 1 الى 16) والعمليات الممثلة بالأحرف (A-B-C-D) والمرحلة (L).
- 2- لخص في نص علمي عواقب استعمال المبيد **Paraquat** على المرحلة الممثلة في الوثيقة ومنه على الظاهرة المدروسة.

التمرين الثاني (7 نقاط):


الانزيمات وسائط كيميائية حيوية مسؤولة عن تحفيز التفاعلات الكيميائية حيث تشترك في العديد من الخصائص رغم اختلاف بنيتها ومن أجل دراسة كيفية تحفيز التفاعلات الكيميائية وكذا سرعة التفاعل الانزيمي نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

انزيم الاستيل كولين استراز (AChE) أساس التأثير المؤقت للأستيل كولين (ACh) في المشبك ويتم التفاعل وفق المعادلة التالية:




الشكل (أ) من الوثيقة (1) يمثل عرض ببرنامج Rastop لبنية انزيم (AChE) والمسؤول عن امادة الاستيل كولين (ACh) أحماضه الأمينية في نهايته ممثلة بالنموذج المكسأ أما الشكل (ب) فيمثل بنية الموقع الفعال لنفس الانزيم كما يمثل الشكل (ج) آلية تحفيز التفاعل الكيميائي ممثلة في المراحل مرتبة (1-2-3)



- 1- قدم وصفاً لإنزيم (AChE) انطلاقاً من الشكلين (أ و ب) للوثيقة (1).
- 2- بيّن آلية عمل إنزيم الاستيل كولين استراز.

الجزء الثاني:

قام العلماء بدراسة سلوك هذا الإنزيم في شروط تجريبية مثلى وذلك عن طريق قياس سرعة النشاط الإنزيمي حيث يبدي الإنزيم خلالها حالة خاصة في تغيرات هذه السرعة، النتائج ممثلة في الوثيقة (2) والتي تمثل سرعة النشاط الإنزيمي في تراكيز مختلفة من (ACh) ورسم تخطيطي لسلوك الإنزيم في النقطتين (A) و (B).




- 1- علّل سلوك الإنزيم وكذا تغير السرعة في الحالتين العادية والخاصة مدعماً اجابتك بمعدلات كيميائية عامة لكل حالة.

التمرين الثالث (8 نقاط):

يعتبر تقصف الشعر من الامراض التي انتشرت مؤخراً وبشكل واسع نتيجة استعمال العديد من المركبات الكيميائية من طرف الرجال والنساء على حد سواء من أجل مظهر أكثر جمالا ولدراسة تأثير هذه المواد على بنية الشعر وسبب تقصفه نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:


يتكون الشعر من طبقة خارجية (Cuticule) للحماية وأخرى داخلية أكثر سمكا وأهمية تدعى (Cortex) تتكون من العديد من الألياف المتنوعة الحجم تحتوي على بروتين الكيراتين (Kératine) المسؤول بفضل بنيته على سلامة ومظهر الشعر، كما نشير بالذكر الى وجود طبقة مركزية. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) عرض لبنية جزء من السلسلتين المكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر أما الشكل (ب) فيمثل النسبة المئوية للأحماض الأمينية للبروتين المدروس.



1- اقترح فرضية تفسر بها تأثير المواد المستعملة على تقصف الشعر.

الجزء الثاني:


من أجل التأكد من صحة الفرضية نقدم اليك الوثيقة (2) والتي تمثل عرض مختلف تأثيرات بروتوكول استخدام طرق فيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية تم خلالها استعمال مواد كيميائية مسببة لتقصف الشعر وهذا باستعمال مؤكسد (حمض) ومرجع (مركب ألكيلي) بالإضافة الى الماء.



- بروتوكول (خطوات) المعالجة
- معالجة كيميائية: استعمال الماء (الشكل -أ-)
- معالجة كيميائية تدعى الارجاع ذلك باستعمال مرجع ألكيلي (Red) (الشكل ب-2-)
- معالجة فيزيائية: تصفيف (الشكل ب-3-)
- معالجة كيميائية: استعمال مؤكسد (Oxd) من أجل النشيط (الشكل ب-4-)



معطيات
أخرى



1- وضح تأثير المركبات الكيميائية والفيزيائية المستعملة على الشعر مدققا صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

أنجز مخطط تبرز فيه العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين مبرزاً بالضبط مستوى تأثير العوامل المدروسة.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (6) صفحة (من الصفحة 6 من 10 الى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول (5 نقاط):

تؤمن انتقال الرسالة العصبية على مستويات مختلفة حسب طبيعتها كهربائية كانت أو كيميائية تدخل أنماط معينة من البروتينات التي تسمح بانتقال الشوارد أو تحافظ عليها في تراكيزها بين الوسط داخل وخارج خلوي، إلا أن بعض المواد الطبيعية مثل **Digitalin** الذي يثبط عمل انزيم الـ ATPase (انزيم امأهة الـ ATP) تؤدي الى كبح انتقال الرسائل العصبية ومنه تعطيل مختلف الوظائف الحيوية، ومن أجل معرفة بعض أنماط هذه البروتينات دورها و عواقب تأثير السم السابق عليها نقدم لك مايلي:

1/ يؤمن انتقال الرسالة العصبية على طول الليف العصبي: 1- القنوات الفولطية. 2- القنوات الكيميائية 3- القنوات المفتوحة باستمرار.	2/ تلعب القنوات الفولطية للـ Na^+ دورا في: 1- كمون بعد مشبكي منبه PPSE. 2- زوال استقطاب. 3- احداث تيار داخلي.
3/ عمل مضخة Na^+/K^+ يتطلب: 1- وجود K^+ في الوسط الخارجي. 2- طاقة على شكل ATP. 3- درجة حرارة مثلى.	4/ كمون العمل متعلق ب: 1- عمل القنوات الفولطية والمضخة. 2- عمل القنوات الكيميائية والمضخة. 3- عمل القنوات الفولطية.
5/ فسفرة مضخة Na^+/K^+ بهدف: 1- تغيير في بنية المضخة. 2- نقل الـ Na^+ الى الوسط الخارجي. 3- ضخ الـ K^+ نحو الخارج.	6/ التعرض لمادة Digitalin يؤدي الى: 1- توزيع متساوي للشوارد على جانبي الغشاء. 2- تسجيل كمون عمل في حالة التنبيه. 3- البقاء في حالة راحة.
7/ يؤثر سم Digitalin على : 1- القنوات الفولطية. 2- القنوات المفتوحة باستمرار. 3- المضخة.	8/ وجود K^+ في الوسط الخارجي ضروري لـ : 1- إزالة فسفرة المضخة والعودة الى البنية الطبيعية. 2- فسفرة المضخة. 3- كمون عمل.


- 1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة من الوثيقة في الأعلى (تقتصر الإجابة على كتابة رقم السؤال والإشارة الى رقم الإجابة مثال: السؤال 9 : 1 و 2).
- 2-
- 3- اشرح في نص علمي كيف يعمل سم Digitoxine على قتل الأشخاص بالتقليل من انتقال الرسائل العصبية ومنه تعطيل مختلف الوظائف الحيوية.

التمرين الثاني (7 نقاط):

تعتبر النباتات الخضراء مقرا لظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنه في جزيئات المادة العضوية وفق سلسلة من التفاعلات الحيوية الهامة المنظمة في مراحل حيث أن استمرار هذه الظاهرة متعلق أساسا بالتوازن بين نواتج هذه المراحل ومن أجل دراسة الاختلال في هذا التوازن وكيفية تصحيحه من طرف النبات نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:


يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) اختصار لتفاعلات إحدى المراحل المهمة في الظاهرة المدروسة أما الشكل (أ) فيظهر نتائج المرحلة الأخرى في الحالة الطبيعية وفي حالة الاختلال نتيجة عوامل مختلفة يتعرض لها النبات منها تعرضه لشدة إضاءة عالية ولمدة زمنية طويلة نوعا ما.



1- وضح حالة الاختلال وتأثيرها على عملية التركيب الضوئي.

الجزء الثاني:

رغم حالة الاختلال فإن الظاهرة المعنية بالدراسة لا تتوقف حيث يلجأ النبات الى العمل على إعادة التوازن وتعويض تراكيز النواتج من أجل استمرارها تمثل الوثيقة (2) من خلال الشكل (أ) نواتج العملية التي تلجأ اليها النباتات في حالة الاختلال أما الشكل (ب) فيمثل الآلية التي يعتمد عليها النبات في هذه الحالة أما الشكل (ج) فيمثل كيفية الحصول على النواتج الممثلة في الشكل (أ)




1- اشرح الآلية التي تمكن النباتات من استعادة التوازن الطبيعي بين مراحلها وبالتالي تركيب ضرورياتها إذا علمت أنها تدعى بالفسفرة الضوئية الحلقية.

التمرين الثالث (8 نقاط):

تقنية العلاج المناعي ضد الأورام السرطانية باستخدام خلايا LT CAR (LT CAR: chemerique antigène récepteur) و هو مستقبل وهمي (لا تركيبه العضوية في الحالة الطبيعية) للمستضد الغشائي من أحدث التقنيات المستعملة و التي تجمع تقريبا بين التقنيات الحديثة الأخرى من حيث العلاج المناعي باستعمال الاجسام المضادة و الخلايا المناعية (TIL) حيث قام العلماء باستغلال الخصائص البنيوية للعناصر الدفاعية المتاحة و التي يمكن تطبيقها حتى في حالات الإفلات المناعي لمعرفة مبدأ علاج السرطان بالخلايا LT CAR و كيفية تطبيقه نقدم اليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:


يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) سلوك الجهاز المناعي ونمط الاستجابة ضد السرطان في مختلف مراحلها أما الشكل (ب) يظهر دور أنواع من بروتينات الخاصة بخلايا (LTc) في حالة التعرف على الخلايا السرطانية أما الشكل (ج) فبظهر اختصارا لعرض مختلف نسيالات أنماط الخلايا وتكبير لاهم الأجزاء فيها يمكن لإحداها أن تكون جزء من خطة العلاج ضد السرطان.



1- اقترح فرضية حول كيفية استغلال الخصائص البنيوية للبروتينات لإيجاد حل للقضاء على السرطان.

الجزء الثاني:

من أجل التحقق من صحة الفرضية السابقة ومعرفة المبدأ المتبع في تقنية العلاج المناعي باستخدام خلايا LT CAR نقدم اليك الوثيقة (2) حيث يمثل الشكل (أ) خطوة مهمة تحضيرية باستعمال معالجات خاصة وفيرسات غير ممرضة معدلة أما الشكل (ب) فيمثل الطريقة التي تتم من خلالها تطبيق العلاج على شخص مصاب بالسرطان مراحلها ممثلة بالخطوات (1 . 2 . 3 . 4)



التمرين الأول:

1- كتابة البيانات: 1

1: فتون ضوئي/ 2: نظام ضوئي PSII / 2': نظام ضوئي PSI / 3: صبغة هوائية/ 4: أصبغة مركز التفاعل P680 / 4': أصبغة مركز التفاعل P700 / 5: ماء/ 6: أكسجين/ 7: بروتونات/ 8: P680 مهيح/ 8': P700 مهيح/ 9: T1 / 10: T2 / 11: T3 / 12: T'1 / 13: T'2 / 14: ATP / 15: حشوة/ 16: تجويف التيلاكوييد

A: الرنين. B: أكسدة ضوئية للماء C: ارجاع $NADP^+$ D: ضخ البروتونات من الحشوة المرحلة L المرحلة الكيموضوئية.

2النص العلمي:

*تميز النبات ظاهرة مهمة حيوية تتمثل في التركيب الضوئي يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في روابط المادة العضوية تتم بتدلسل تفاعلات حيوية هامة ومنظمة في مراحل الا ان بعض المركبات كمبيد Paraquat تعيق هذه العملية وبالتالي تقضي على النبات، فكيف يؤدي رش مبيد Paraquat على النبات الى وقف نموه ثم القضاء عليه؟

*تحدث عملية التركيب الضوئي وفق مرحلتين هامتين المرحلة الكيموضوئية التي تحدث على مستوى التيلاكوييدات وذلك في توفر الشروط الممثلة في الضوء الماء مسبقا هائي للالكترونات $NADP^+$ مؤكسد و $ADP+Pi$ ، عند سقوط الفوتونات الضوئية على الاصبغة اليخضورية تنتج مكنسية طاقة لتفقدونها دون ان تفقد الالكترونات في تسلسل بينها ما يسمى بالرنين تصل الطاقة الى زوج اليخضور أ في مركز التفاعل لتنتج ويخفض كمون ارجاعها ما يؤدي الى اكسدتها لتفقد الكترونين عالية الطاقة لكل نظام ضوئي تنتقل الالكترونات تلقائيا من كمون اكسدة و ارجاع منخفض الى كمون اكسدة و ارجاع مرتفع عبر نواقل الالكترونات حيث يقوم T1 بتثبيت بروتونين من الحشوة ليتأكسد مرة اخرى مرجعا الناقل T2 ممررا اليه الروتين فيستغل هذا الاخير طاقة الالكترونات لضخ البروتونين الى تجويف التيلاكوييد، ثم يتأكسد ليرجع بدوره الناقل T3 ليتأكسد مرجعا النظام الضوئي PSI تنتقل الالكترونات الناتجة عن اكسدة PSI عبر نواقل الالكترونات T'1 T'2 بنفس الآلية ليرجع المستقبل النهائي للالكترونات $NADP^+$ الى $NADPH.H^+$ بتثبيت بروتونين من الحشوة و يتم ارجاع PSII نتيجة الاكسدة الضوئية للماء، يصبح تجويف التيلاكوييد نتيجة نشاطها حامضي نتيجة تراكم البروتونات الناتجة عن الاكسدة الضوئية للماء التي تم ضخها من الحشوة، تتدفق البروتونات على شكل سيل عبر الكرية المذنبة مولدة طاقة تستغل من طرفها لتقوم بفسفرة ADP في وجود Pi الى ATP

تنتهي المرحلة الكيموضوئية بانتاج الاكسجين ينطلق في الهواء مستقبل نهائي في حالة مرجعة $NADPH.H$ و ATP حيث تعتبر هذه المركبات متطلبات لحدوث الخطوة الثانية وهي المرحلة الكيموحيوية و بالتالي تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية المركبة ومنه حدوث التركيب الضوئي

في حالة استعمال المبيد Paraquat يتفاعل مع بروتين النظام الضوئي الأول ما يؤدي الى عدم أكسدته وبالتالي عدم تحرير الالكترونات ومنه لا يتم ارجاع $NADP^+$ هذا من جهة ومن جهة أخرى تتوقف اكسدة النظام الضوئي لثاني لعدم استقبال الكتروناته من طرف PSI ومنه تتوقف اكسدة الماء وتصبح كل السلسلة التركيبية الضوئية في حالة مرجعة ومنه يتوقف ضخ البروتونات من الحشوة الى تجويف الكيس لغياب انتقال الالكترونات ومنه عدم تشكل تدرج في تركيزها فلا يتم تنشيط الكرية المذنبة ولا تنتج ATP وهذا ما يعيق حدوث المرحلة الكيموضوئية وفي غياب نواتج هذه الأخيرة لا يتم تثبيت غاز الفحم و تركيب المادة العضوية الضرورية لتسيير مختلف النشاطات الحيوية فيتوقف نمو النبات الذي يعتمد على المادة والطاقة المستمدة من نواتج التركيب الضوئي ويموت

* طالما تثبط المبيدات ظاهرة التركيب الضوئي ينبغي استعمالها تحت الرقابة وبمساعدة التقنيين المختصين حتى لا تؤثر على باق النباتات الزراعية

طالما المبيدات مواد سامة ينبغي اتخاذ تدابير الوقاية من تأثيرها على الانسان والحيوان وباقي عناصر النظام البيئي.

* مدام المبيدات مواد سامة هل تؤثر سلبا على مردود النباتات الزراعية، الانسان والحيوان؟

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

1 وصف انزيم الـ AchE

يمثل كل من الشكل (أ) عرض بنية ثلاثية الابعاد لأنزيم الاستيل كولين استراز أما الشكل (ب) فيمثل رسم تخطيطي لبنية الموقع الفعال. الانزيم عبارة عن سلسلة واحدة تتكون من 535 حمض أميني ذو بنية ثالثة عدة بنيات ثانوية α و β ومناطق انعطاف، موقعه الفعال عبارة عن جزأين موقع أيوني مكون أساسا من حمضين أميين His447/Glu334 ترتبط فيها وظائف الاحماض الامينية برابطة انتقالية و موقع إستيري: مكون أساسا من حمض أميني Ser203 وظيفة جذره تشكل رابطة انتقالية مع وظيفة جذر الحمض الاميني His447

2 تبين آلية عمل أنزيم استيل كولين استراز

يمثل الشكل ج مراحل آلية التحفيز الانزيمي حيث نلاحظ:

- 1/ تكامل بنيوي بين الموقع الفعال لأنزيم AChE والركيزة ACh وذلك بتشكيل روابط كيميائية انتقالية بين جزء الكولين من الركيزة ووظيفة جذر الحمض الأميني Glu334 (رابطة شاردية) من الموقع الأيوني كما تتشكل أيضا رابطة كيميائية بين جزء الاستيل من الركيزة ووظيفة الحمض الأميني Ser203 من الموقع الاستيري.
- 2/ يتم خلال هذه المرحلة كسر الرابطة بين جزء الاستيل و الكولين حيث يتم تحرير جزيئة الكولين من الموقع الأيوني أما الموقع الاستيري فمرتبط جزء الركيزة المتبقي (الاستيل) و يثبت الهستدين جزيء الماء.
- 3/ تعود وظيفة الحمض الاميني (Ser203) الى الحالة الأولية (في غياب الركيزة) و كذا يتم تحرير حمض الاسيتات وهذا بفضل جزيء الماء (إرجاع انطلاقا من هيدروجين الماء)

الاستنتاج:

يتم أمأة (ACh) نتيجة تشكيل روابط كيميائية انتقالية و تحرير جزئيتين الكولين وحمض الأسيتات كناتج بفضل خصائص الموقع الفعال.

الجزء الثاني:

تمثل الوثيقة (2) تغيرات السرعة الابتدائية للانزيم (AChE) بدلالة تركيز الركيزة (ACh) وكذا سلوك الانزيمين في النقطتين (A) و (B).

الحالة العادية

- الجزء (1) تلاحظ تزايد في سرعة النشاط الأنزيمي في حالة التراكيز الضعيفة
الجزء (2) ثبات في سرعة لنشاط الأنزيمي عند سرعة أعظمية (Vmax) في التراكيز العالية والقوية

حالة خاصة

- الجزء (1): نلاحظ تزايد في سرعة النشاط الأنزيمي في الجزء (أ) في حالة التراكيز الضعيفة
الجزء (2): تصل سرعة النشاط الأنزيمي الي سرعة أعظمية (Vmax) ثم تتناقص السرعة تدريجيا كلما زادت التراكيز القوية والعالية للركيزة

الاستنتاج في الحالة العادية تتناسب سرعة نشاط إنزيم (AChE) طردا في حالة التراكيز الضعيفة وتكون ثابتة في حالة التراكيز العالية أما في الحالة الخاصة تتناسب طردا في حالة التراكيز الضعيفة وعكسا في حالة التراكيز العالية.

انطلاقا من الرسم التخطيطي لسلوك الانزيم في النقطة (A) و (B) نلاحظ:


النقطة (A) حدوث تكامل بنيوي عادي بين الموقع الفعال لإنزيم (AChE) وكذا الركيزة (ACh) وبالتالي يتم تحفيز الركيزة وتفكيكها للحصول على الناتج الممثل بـ حمض الاسيتات وكذا جزيئة الكولين

في النقطة (B) ارتباط وتكامل بين الموقع الفعال لإنزيم (AChE) وجزئيتين من لركيزة بشكل غير عادي حيث تشكلت روابط كيميائية انتقالية بين جزء الكولين من الركيزة الأولى مع الموقع الأيوني (Glu334) بالإضافة الى رابطة أخرى كيميائية انتقالية بين جزء الاستيل من الركيزة الثانية (أخرى) مع الموقع الاستيري (Ser203)


ثبات السرعة عند قيمة أعظمية (Vmax) في الحالة العادية راجع لحالة تشبع (جميع الوحدات الازيمية مشغولة نتيجة الارتباط العادي للركيزة مع الموقع الفعال) وتحفيز التفاعل الانزيمي بشكل عادي.

أما تناقص السرعة في الحالة الخاصة راجع الى ارتباط الموقع الفعال بأكثر من ركيزة واحد (ركيزتين) وهذا نتيجة بنية وخصائص الموقع الفعال وبالتالي يحدث تكامل بنيوي غير عادي مثبطا نشاط الانزيم و عدم حوث التحفيز ما يبرر سلوك انزيم (AChE) في هذه النقطة

الحالة العادية



الحالة الخاصة



التمرين الثالث:

الجزء الأول

اقتراح فرضية لتفسير تأثير المواد المستعملة على تقصف الشعر

الشكل (أ) يمثل عرض لبنية جزء من السلسلتين المكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر حيث يتكون الكيراتين من سلسلتين الجزء

المعروض عبارة عن بنيتين ثانويتين α تستقر البنية عن طريق روابط هيدروجينية بين مجاميع CO و NH للجزء الثابت كما ترتبط السلسلتان بروابط كيميائية أخرى ممثلة بالعديد من الجسور ثنائية الكبريت . بالإضافة إلى الروابط الشاردية (ملحية) .

الاستنتاج: يستقر بروتين الكيراتين بفضل الروابط الكيميائية التي تنشأ بين وظائف الاحماض الأمينية.

الشكل (ب) يمثل أعمد بيانية للنسبة التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية لبروتين الكيراتين. حيث نلاحظ أن نسبة الحمض الأميني المسؤول عن تشكيل الجسور ثنائية الكبريت كبيرة تقدر ب 17% تقريبا مقارنة بالأحماض الأمينية الأخرى حيث تكون نسبة كل من Ser وGlu في حدود 12% تقريبا بينما نلاحظ نسب أن و متساوية للأحماض الامينية Arg/Glu/The ب 6%

الاستنتاج: يحافظ الكراتين على بنته من خلال الجسور ثنائية الكبريت خاصة.

التركيب

يحافظ الكيراتين على بنيته من خلال العديد من أنواع الروابط الكيميائية المختلفة خاصة الجسور ثنائية الكبريت و منه فان المواد الكيميائية تعمل على تغير بنية الكيراتين عن طريق كسر و تغير مواقع الروابط الكيميائية خاصة الجسور ثنائية الكبريت ما يؤدي إلى تقصف الشعر.

الجزء الثاني

تمثل الوثيقة (2) عرض لمختلف تأثيرات بروتوكول معالجة فيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية تم خلالها استعمال مواد كيميائية حيث تلاحظ:

الشكل أ: المعالجة الكيميائية باستعمال الماء يتفاعل مع الوظائف المشكلة للروابط الشاردية و الهيدروجينية حيث تتفكك الروابط الشاردية و الهيدروجينية وتبقى الجسور ثنائية الكبريت.


الشكل ب2: معالجة كيميائية تدعى الارجاع ذلك باستعمال مرجع الكيلي (Red): يؤدي المركب المرجع إلى إرجاع الوظائف الكبريتية المشكلة للجسور ثنائية الكبريت ليتم في النهاية تكسيدها وإزالتها وتصبح الوظائف حرة (SH) و تنفصل سلسلتي الكيراتين.

الشكل ب3: معالجة فيزيائية تصفيف هو معالجة ميكانيكية تؤدي إلى انزلاق السلسلتين المنفصلتين بالنسبة لبعضها البعض نحو الأعلى والأسفل

الشكل ب4: معالجة كيميائية استعمال مؤكسد (Oxd) من أجل التثبيت يتم خلال هذه المرحلة أكسدة وظائف الحرة لجذور الأحماض الامينية من نوع Cys لتتشكل جسور ثنائية الكبريت في غير أماكنها وبعدد أقل كما تبقى بعض الوظائف (SH) حرة

و منه تؤدي المعالجة الفيزيائية والكيميائية في الأخير إلى كسر الجسور ثنائية الكبريت من جهة (ارجاع) وتشكيلها من جديد في غير أماكنها وبعدد أقل (أكسدة) و منه فان المركبات الكيميائية في الأخير تؤدي إلى تغير البنية ما يؤدي إلى تقصف الشعر ومنه فان الفرضية المقترحة صحيحة.

الجزء الثالث:



التصحيح النموذجي للموضوع الثاني

التمرين الأول:

اختيار الإجابة الصحيحة: 1:1 2:2 و 3 3: 1 و 2 و 3 4: 3 5: 1 و 2 6: 1 7: 3 8: 1

النص العلمي:

تكسب بروتينات خاصة الألياف العصبية فرق كمون غشائي يؤهلها لنقل السيالة العصبية ، إلا أن مواد طبيعية مثل الديجيتالين الذي يبيعض البروتينات الغشائية فتفقد خصائصها و منه وظيفتها. فكيف يؤدي تفاعل هذا السم مع بعض البروتينات الغشائية في الألياف العصبية إلى قتل الأشخاص بالتقليل من انتقال الرسائل العصبية ؟

تسمح بروتينات في أغشية الألياف العصبية بنشوء فرق في الكمون الغشائي و المحافظة عليه ، يسمح لها بنقل الرسائل العصبية على طولها . ينشأ الفرق في الكون على جانبي غشاء الليف نتيجة التوزيع غير المتساوي لشوارد الصوديوم و البوتاسيوم حيث يحتوي غشاء الليف على بروتينات تعمل كقنوات تسرب للشوارد ، فتتسرب شوارد الصوديوم بالميز من خارج الليف حيث تركيزها عالي إلى داخله بينما تتسرب شوارد البوتاسيوم من داخل الليف حيث التركيز العالي إلى خارج حيث تركيزها منخفض عبر قنوات تسرب خاصة بها . ينتج عن ما يحتويه الليف من شوارد البوتاسيوم و حركتها كمونه الغشائي حتى سمي كمون الراحة بفرق كمون البوتاسيوم .

للمحافظة على التراكيز المتبادلة و نه فرق كمون الراحة يحتوي غشاء الليف العصبي على بروتين إنزيمي يعمل كمضخة لطرح شوارد الصوديوم التي تتسرب إلى داخل الليف بالميز و إدخال شوارد البوتاسيوم التي تخرج . بشكل متزامن و من أجل ذلك تستهلك (تصرف) طاقة على شكل ATP .

يعمل سم الديجيتالين على تثبيط عمل انزيم ATPase ومنه تثبيط عمل المضخة وبالتالي تفقد قدرتها على أداء وظيفتها في نقل شوارد الصوديوم و البوتاسيوم عكس تدرج تركيزها لتحافظ على كمون الراحة للليف العصبي. بفقدان القدرة على المحافظة على كمون الراحة تفقد الألياف العصبية وظيفتها في نقل الرسائل العصبية و منه تعطيل الانسجق والتحكم في الوظائف الحيوية مثل النشاط العضلي للقلب و القفص الصدري في التنفس ... ما يؤدي إلى موت الأشخاص التي تتعرض للتسمم بجرعات قاتلة.

وعليه يجب التعريف بالنباتات السامة في المحيط حتى ننتج استهلاكها أو تقديمها للحيوانات كأعلاف و بالتالي تفادي ضررها بحدوث التسممات

ألا يمكن علاج التسممات الناتجة عن استهلاك هذا السم على غرار عالجة لسعات الحيات باستعمال أمصال مضادة ؟

هل يمكن الاستفادة من هذا السم كعلاج لبعض الأمراض ؟ (الفشل الاحتقاني للقلب)

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

ايضاح حالة الاختلال وتأثيرها على عملية التركيب الضوئي

يمثل الشكل أ: أعمدة بيانية تبين تغيرات كل من $NADPH^+$ و ATP و O_2 حيث نلاحظ

*في الحالة الطبيعية يتراوح تركيز كل من O_2 و ATP و 18 وا بينما تركيز $NADPH_2$ فيقدر ب 12 وا في حين نلاحظ

*في حالة الاختلال يحافظ كل من $NADPH_2$ و O_2 على نفس التركيز مقارنة مع الحالة الطبيعية أما بالنسبة إلى ATP فنسجل

انخفاض مقارنة بالحالة الطبيعية حيث أصبح يقدر ب 9 وا

الاستنتاج: في حالة الاختلال ينخفض تركيز ATP عند النبات الاخضر

يمثل الشكل ب اختصار لتفاعلات حلقة كالفن حيث تلاحظ

في وجود CO_2 3 يتم تحويل $3 RuDP$ إلى $3 APG$ ثم باستغلال 6 جزيئات ATP تتم فسفرتها إلى $6 ADPG$ ليتم استعمال $6 NADPH$ الناتجة عن المرحلة الكيموضونية وازالة 6 جزيئات من الفسفور لانتاج $PGa6$ بعدها يحدث انشطار لهذه الأخيرة حيث جزيئة منها تعطي المادة العضوية اما 5 جزيئات الباقية تؤمن تجديد $3 RuDP$ باستعمال 3 جزيئات من ATP الناتجة عن المرحلة الكيموضونية

الاستنتاج تؤمن نواتج المرحلة الكيموضونية احداث المرحلة الكيموضونية باستعمال تركيز عالي من ATP و تركيز أقل من $NADPH$

التركيب

حالة الاختلال مرتبطة بانخفاض تركيز ATP بينما نواتج المرحلة الكيموضونية ضرورية لحدوث المرحلة الكيموضونية وتركيب المادة العضوية و عليه حالة الاختلال تكمن في ضعف تركيز ATP الذي يؤدي إلى توقف المرحلة الكيموضونية وبالتالي توقف التركيب الضوئي

الجزء الثاني

شرح الآلية التي تمكن النبات من استعادة التوازن الطبيعي بين مراحل التركيب الضوئي

يمثل الشكل أ تغيرات تركيز نواتج لمرحلة يقوم بها النبات اثناء الاختلال حيث نلاحظ ارتفاع تركيز ATP الى 18 و ا بينما نلاحظ انعدام كل من الاكسجين و NADPHH

الاستنتاج يقوم النبات الاخضر اثناء حالة الاختلال برفع كمية ATP دون NADPHH و الاكسجين.

يمثل الشكل ب الآلية التي يعتمد عليها النبات في حالة الاختلال حيث نلاحظ عند سقوط الفوتون الضوئي على الأصبغة الهوائية لل PSI يتم نقل الطاقة دون الاكترون ما يسمى بالرنين لتصل هذه الطاقة إلى صبغة مركز التفاعل فينخفض كمون الأكسدة والارجاع من 0.4 إلى 1.3- حيث يتأكسد P700 لتنتقل من كمون أكسدة وارجاع منخفض إلى كمون أكسدة و ارجاع مرتفع عندها يتم ارجاع الناقل : T¹ ليرجع هذا الأخير للناقل T¹ بدل T² وبعدها تنتقل الكترونيات إلى الناقل T² والذي يثبت أيضا بروتونين من الحشوة ويضخها في تجويف التيبلاكويد باستغلال طاقة الاكترونين اما الاكترونات تنتقل إلى T³ لتعود إلى P700

الاستنتاج: في حالة الاختلال يتم ضخ البروتونات من الحشوة بأكسدة P700

أما الشكل ج فيمثل الفسفرة الضوئية حيث تلاحظ تتم فسفرة ADP إلى ATP في وجود Pi بتدخل انزيم ATP سنتاز و هذا في وجود طاقة يؤمنها سيل البروتونات المتدفقة عبر الكرية المذنبة مصدرها ضخ البروتونات من الحشوة بأكسدة P700 من طرف الناقل T² دون الاكسدة الضوئية للماء و دون ارجاع NADP⁺

الاستنتاج تدفق البروتونات عبر الكرية المذنبة شرط لفسفرة ADP إلى ATP في وجود Pi

التركيب يقوم النبات خلال حالة لاختلال باعادة التوازن الطبيعي عن طريق انتاج ATP فقط دون الاكسجين و دون ارجاع المستقبل النهائي حيث يتأكسد PSI فقط بشكل حلقي فهو من يفقد الاكترونات التي تستعمل في ارجاعه. وفي ضخ البروتونات من طرف الناقل T² إلى تجويف التيبلاكويد لينتقل فرق في تركيز البروتونات يسمح بسيولها عبر الكرية المذنبة لتتولد طاقة تستغلها في فسفرة ADP الى ATP في وجود Pi ما ينتج عنه ارتفاع في تركيز ATP دون اكسدة الماء ودون ارجاع NADP انها الفسفرة الضوئية الحلقية .

التمرين الثالث:

الجزء الأول:

اقتراح فرضية حول كيفية استغلال الخصائص البنيوية للبروتينات للضوء على السرطان.
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) سلوك الجهاز المناعي ونمط الاستجابة ضد السرطان في مختلف مراحل في المراحل الأولى للسرطان حيث نلاحظ تماس عشائي بين خلايا الLTC و الخلايا السرطانية نتيجة حدوث تعرف مزدوج لتكامل بين TCR على ببتيد مستضدي و HLAI ينتج اطراح البرفورين و انتظامه على غشاء الخلية السرطانية مؤدية إلى إحداث صدمة حلولية نتيجة دخول الماء والشوارد و عمل الانزيمات (الغروانزيم)

في المراحل المتقدمة للسرطان : نلاحظ عدم حدوث تماس عشائي بين خلايا الLTC و الخلايا السرطانية نتيجة أن هذه الأخيرة لا تقوم بعرض معقد ببتيد مستضدي HLAI حيث يتم عرض محدد مستضد يدعى بل Neo antigene مما يعيق تعرف الخلايا التائية السامة عليه بشكل مزدوج على الخلايا السرطانية و منه عدم إمكانية القضاء عليها

الاستنتاج : في المراحل الأولى تتعرف LTC على الخلايا السرطانية ولا تستطيع ذلك في المراحل المتقدمة لعرض الخلايا السرطانية لل Neo-antigene

الشكل (ب) يظهر دور أنواع من بروتينات الخاصة بخلايا (LTC) في حالة التعرف على الخلايا السرطانية حيث نلاحظ: بعد حدوث التعرف المزدوج بفضل ال-TCR يقوم بروتين عشائي ممثل في ال-CD3 بإصدار إشارة تركيب وبالتالي إفراز البرفورين و أحداث صدمة حلولية.

الاستنتاج : TCR مسؤول عن التعرف المزدوج أما CD3 مسؤول عن تنشيط تركيب و إفراز البرفورين.

الشكل (ج) يظهر اختصارا لعرض مختلف نسيالات أنماط الخلايا حيث نميز وجود عدة نسيالات من الخلايا LT8 مصدر LTC ليس لها القدرة على القضاء الخلايا السرطانية نتيجة عدم عرض معقد ببتيد مستضدي - HLAI أما نسيالات LB فنلاحظ وجود الأنواع من BCR على سطح أغشية خلايا للمفاويات البائية تكامل بنويو النسيل رقم 2 Neo-antigen إلا أنها غير مؤهلة للقضاء على الخلايا السرطانية.

الاستنتاج: الخلايا LTC لا تتعرف على الخلايا السرطانية لوجود TCR لذا لا تقضي عليها بينما الخلايا LB تتعرف بفضل BCR على الخلايا السرطانية ولكنها غير مؤهلة للقضاء عليها.

التركيب في المراحل الأولى تتعرف LTC على الخلايا السرطانية و لا تستطيع ذلك في المراحل المتقدمة لعرض الخلايا السرطانية لل Neo-antigene فقط حيث أن TCR لا يستطيع التعرف عليها بشكل مزدوج أما CD3 فهو مسؤول عن تنشيط إفراز البرفورين بعد التعرف على الخلايا السرطانية كما أن الخلايا التي يمكنها التعرف بشكل مباشر على الخلايا السرطانية فهي LB بفضل ال-BCR الا أنها غير مؤهلة لاقتصاصها.

الفرضية المقترحة: تركيب خلايا لمفاوية مؤهلة للقضاء على السرطان LTC عن طريق تركيب مستقبل غشائي يملك خصائص التعرف المباشر مثل BCR وخصائص إفراز البرفورين مثل CD3 وبالتالي يتم إقصاء المستضد

الجزء الثاني

شرح كيف استغل العلماء خصائص مختلف البروتينات في الدفاع عن العضوية في استحداث طريقة للقضاء على السرطان في حال افلاته من الجهاز المناعي
يمثل الشكل (أ) خطوة مهمة تحضيرية يتم خلال هذه المرحلة تحديد وعزل المورثة المسؤولة عن الجزء المتغير من BCR و الذي يكامل الـ Neo-antigene بالإضافة إلى عزل المورثة المشفرة لبروتين CD3 حيث يتم تركيب مورثة لبروتين وهمي CAR و دمجها في الأخير في فيروس معالج.

الاستنتاج: مورثة المستقبل الوهمي تشفر لجزء من BCR و بروتين CD3

- الشكل (ب) يمثل الطريقة التي تتم من خلالها تطبيق العلاج على شخص مصاب بالسرطان بعد عزل جزء من السرطان به خلايا LTc
- 1- يتم إضافة فيروسات معدلة غير ممرضة تملك خاصية دمج المورثات مثل الـ VIH و بالتالي يتم دمج المورثة المشفرة للمستقبل الغشائي CAR لتصبح LTC معلة وراثيا
 - 2- يتم تعبير المورثة (استنساخ وترجمة) ليتم تركيب المستقبل الغشائي الوهمي و المكون أساسا من الجزء (أ) جزء متغير من المستقبل BCR مرتبط ببروتين CD3 تكون هذه البروتينات معروضة على سطح أغشية الخلايا المعدلة وراثيا لتصبح خلايا LT CAR
 - 3- يتم تضخيم LT CAR و زيادة عددها عن طريق حقن IL2 لنتحصل على لمة.
 - 4- يتم إعادة حقنها في الشخص المصاب والمأخوذة في الأصل منه لتقوم خلايا LTc بالتعرف المباشر عن طريق الجزء المتغير من CAR و إفراز البرفورين نتيجة إشارات التركيب الخاصة بـ CD3 و منه إقصاء الخلايا السرطانية في المراحل المتقدمة

التركيب : CAR هو مستقبل غشائي وهمي حيث أنه يتميز بجزء متغير من BCR يقوم بالتعرف المباشر (مميز) على Neo-antigene مميز لسرطان معين من جهة و من جهة أخرى مرتبط ببروتين مميز للـ LTc يدعى بـ CD3 مسؤول عن تركيب و إفراز البرفورين وبالتالي أقضاء الخلايا السرطانية عن طريق الصدمة الحلولية و منه فإن الفرضية المقترحة صحيحة.

